

Ueber den Erfolg von 90 eitrigen Adnex-Operationen

ausgeführt in der
Universitäts-Frauenklinik zu Basel
in den Jahren 1901—1908.

Inaugural-Dissertation

der
hohen medizinischen Fakultät
der

Universität Basel

zur Erlangung der Doktorwürde

vorgelegt von

Felix Barth

prakt. Arzt
aus Basel.

1910
Buchdruckerei L. Koch, Romanshorn.

Ueber den Erfolg von 90 eitrigen Adnex-Operationen


ausgeführt in der
Universitäts-Frauenklinik zu Basel
in den Jahren 1901—1908.

Inaugural-Dissertation

der
hohen medizinischen Fakultät
der

Universität Basel

zur Erlangung der Doktorwürde



vorgelegt von

Felix Barth

prakt. Arzt
aus Basel.

1910

Buchdruckerei L. Koch, Romanshorn.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Meinem lieben Vater

Dr. med. Paul Barth

in Dankbarkeit

gewidmet.

Ueber das Für und Wider operativer Behandlung eitriger Adnextumoren ist in den letzten Jahren viel gestritten worden. Während in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts viel operiert worden war, wird jetzt wieder mehr die conservative, abwartende Methode angewandt, weil erkannt wurde, dass man die Gefahr der Anwesenheit von Eiter in der Tube als viel zu gross angesehen hatte, ebenso wie den Erfolg der Operation.

Auch die Frage, wann und wie operiert werden soll, ob mit oder ohne Drainage, ist noch viel umstritten, besonders da die Resultate aus den einzelnen Kliniken sehr verschieden lauten.

Nach den in der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Köln a. Rh. 1908 mitgeteilten Erfahrungen Prochovnick's soll erst nach einer genauen klinischen Beobachtung und dem misslungenen Versuch konservativ zu behandeln, operiert werden. Prochovnick fasst seine Ergebnisse in folgenden Sätzen zusammen:

1. Schwerkranke, die jeder Behandlung trotzen, operiere man nach einer genauen klinischen Beobachtung von 4—5 Wochen falls nicht Tuberkulose im Spiel ist.

2. Allen Frauen, die nach längerer, konservativer Krankenhausbehandlung keine objektive Besserung der Befunde zeigen und schnell rückfällig werden, ist ein operativer Eingriff anzuraten. Nur wenn Abscessentleerung in Aussicht steht, versuche man eine wiederholte conservative Therapie. Frühzeitiges Eingreifen gestattet hier oft Erhaltung von Organen und Funktionen.

3. Unbedingt früh zu operieren ist bei einseitigen Geschwülsten, wenn ein Zusammenhang mit Blinddarmerkrankung sicher oder stark wahrscheinlich ist.

4. Beim Zusammentreffen von Tuberkulose mit andern Infektionen, insbesondere Gonorrhoe, sowie bei reiner Tuberkulose ist nur bei schwersten örtlichen Leiden, wenn Lunge und Harnorgane zur Zeit frei oder nahezu frei sind, operativ vorzugehen und zwar radikal.

5. Dauernde Fistelgeschwülste, in erster Linie bei Verbindung von vereiterten Tumoren mit Darmabschnitten, sollen, wenn sie

nicht extraperitoneal für ausgiebige Drainierung zugänglich sind, frühmöglichst und radikal angegriffen werden. —

Die Frage, ob und wie drainiert werden soll, wird sich im allgemeinen erst bei der Operation selbst beantworten lassen. So drainiert Fehling;


1. Wenn bei einer Laparotomie Eiter oder Jauche in grösserer Menge ins Operationsgebiet gelangt, wo auf ausgedehnte Strecken ein gesundes Bauchtell fehlt, oder wo grössere Bindegewebsräume eröffnet worden sind.

2. Wenn grössere Stücke einer eitrigen oder nekrotischen Sackwandung zurückgelassen werden mussten, die man nicht durch technisches Verfahren von der freien Bauchhöhle abschliessen kann.

3. Wenn eine anders nicht zu stillende parenchymatöse Flächenblutung oder eine venöse Blutung aus der Tiefe des kleinen Beckens eintritt (aus Notbehelf).

4. Wenn Verletzungen oder zuvor bestehende Fisteln des Dickdarmes oder der Blase vorhanden sind.

Im Frauenspital zu Basel wurden in den Jahren 1901 bis 1908 neunzig Fälle eitrig-er Adnextumoren operiert. Herr Prof. Dr. v. Herff hatte die Güte, mir aus seinem klinischen Material die Krankengeschichten dieser Fälle zu überlassen, deren Auszüge ich im folgenden wiedergebe.



Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
1.	B.-M., M. 42 Jahr St. Ludwig Zürich.	1901 236	I Lös. d. Place.	Vor 7 Wochen erkrankte Pat. an Bauch- und Brustfellentzündung. Nach 4 Wochen keine Schmerzen mehr; kein Fieber. Jetzt seit 14 Tagen Schmerzen in der l. Bauchseite bis zum Rippenbogen. Beständ. gelbweisser Fluor. Periode regelmässig, ohne Mollimina.	In der linken Inguinalgegend ein ballotierender, auf Druck empfindlicher, Tumor durch die Bauchdecken durchtastbar. Uterus klein, anteflectiert. Im hintern Scheidengewölbe links, ein Tumor fühlbar. Diagnose: Salpingo-oophoritis duplex.
2.	Z.-M. 26 Jahr Blotzheim Elsass	1901 242	I Steiss- Lage	Letzte Niederkunft 22. III.01. Wochenbett fieberhaft, angeblich wegen Influenza. Damals heftige Leibschmerzen. Jetzt beidseits im Unterleib heftige Schmerzen, bes. bei Bewegungen. Patient ist seit der letzten Geburt bettlägerig. Letzte Periode am 23. IV. Nur 1 Tag lang.	Uterus klein, antepo- niert, -flectiert. Rechts vorne ein höckeriger Tu- mor, der bis an die lin- ken Adnexe reicht, die abtastbar sind, aber auch in einer Verdickung lie- gen. Diagnose: Salpingo- oophoritis dextra.
3.	G. E. 22 Jahr Ladentochter Basel Bayern	1901 243	○	Periode seit 1/2 Jahr schmerzhaft. Vor Ein- tritt derselben gelben Ausfluss. Seit 3 Wochen stechende Schmerzen im Unterleib, besond. links. Brennen beim Wasserlö- sen. Fieber. Abgang von Eiter per rectum et va- ginam. Blutiger Urin.	Uterus anteflectiert, si- nistroponiert. Auf der r. Seite ein grosser Tumor fühlbar, links ein klei- nerer Tumor. Leib bei Berührung sehr schmerz- haft. Diagnose: Pyosalpinx et Pyovarium duplex.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation.	Entlassungsstatus	Austritt
21. V. 01. Salpingoophorectomia duplex per laparotomiam. Tamponade nach Mikulicz. Auf der linken Seite ein faustgrosser, mit der Umgebung durch dicke Schwarten verbundener Tumor (Tube u. Ovarium), bei dessen Trennung reichlich Eiter vorquillt. R. Tube verdickt, ebenso r. Ovarium, beide in Adhaesionen gebettet, bei deren Lösung ebenfalls Eiter vorquillt. Da eine grosse fetzige, leicht blutende Wunde zurückbleibt, Mikulicz'. Tamponade. Verband.	Glatte Verlauf. 12. VI. Entfernung d. Schürze. Grosser Pyocyaneusrasen. Wunde heilt per granulationem. Am 9. VII. treten die Menses stark auf.	Wunde bis auf einen kleinen granulierenden Trichter geheilt. Uterus klein, anteflectiert.	13. VII. 01
27. VI. 01. Salpingoophorectomia dextra per laparotomiam. Tamponade nach Mikulicz. Die rechten Adnexe sind mit Dünndarmschlingen zu einem grossen Tumor verwachsen. Bei der Lösung entleert sich aus dem Ovarium u. der Tube grünlicher nicht stinkender Eiter. Abtragen des Adnextumors an seinem Stiel. Mikulicz'scher Gazebeutel. Verband.	Einmal Brechen. Am Tag nach der Operation einmal 40,20. Sonst Verlauf afebril und glatt. 5. VII. Entfernung des Beutels.	In der Bauchwunde im untern Drittel ein noch 1 1/2 cm. tiefer, schön granulierender Trichter.	29. VII. 01
27. VI. 01. Laparotomie. Eröffnung einer mit der Bauchwand leicht verklebten Pyosalpinx. Aus dem Tumor entleert sich massenhaft stinkender Eiter. Vernähen der Abscesswand mit der Bauchwand. Spülung mit H² O². Tamponade mit steriler Gaze.	Oeffters Brechen. Viele Schmerzen. Temp. 39,5 Puls 164. Abends Exitus letalis.		27. VII. 01

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
4	Tsch.-Sp. Jos. 33 Jahr Elsass	1901 250	○	Seit 1/2 Jahr Schmerzen links im Unterleib und Brechen, in letzter Zeit Brennen beim Wasserlösen. Stuhlgang stets obstipiert, schmerzhaft. Periode immer regelmässig. Nach Aufhören derselben jeweils stechende Schmerzen auf der linken Seite.	Uterus klein, anteflektiert, dextroponiert, reclinert. Im Douglas ein grosser Tumor zu fühlen, im untern Teil cystisch, mit kleinen Höckern. Linke Adnexe scheinen in dem genannten Tumor aufgegangen zu sein. Rechte Adnexe frei. Diagnose: Tumor tuboov. sin.
5	N.R. 23 Jahr Basel Thurgau	1901 313	○		Leib ist aufgetrieben, schmerzhaft. Rechts, oberhalb vom Poupart'schen Bande eine Fistelöffnung mit eitrigem Ausfluss.
6	B.-O. Carol. 34 Jahr Basel Frankreich	1901 317	III norm.	Seit 2 Monaten gravid. Vor 3 Wochen starker Blutabgang. Seither heftige, krampfartige Schmerzen, die die Patientin ins Bett fesselten. Vor fünf Tagen wieder starker Blutverlust und Steigerung der Krämpfe. Kein Erbrechen. Kein Fieber.	Uterus entsprechend vergrössert. R. h. im Douglas ein prallelast. Tumor fühlbar. R. Tube verdickt, als ein harter Strang fühlbar. Grosse Schmerzhaftigkeit. Punktion ergibt serös-eitrige Flüssigkeit. Linke Adnexe ohne Veränderung. Diagnose: Tumor tuboov. dext.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
23. V. 01. Salpingoophorectomia per laparotomiam. Tamponade nach Mikulicz. Beim Versuch, den faustgrossen, aus Tube u. Ovarium bestehenden und mit der Umgebung fest verwachsenen Tumor, stumpf zu lösen, bricht derselbe ein. Es entleert sich fäculent riechender Eiter in die Bauchhöhle. Entfernung der Abscessmembran. Tamponade nach Mikulicz.	Mehrmals Brechen. Wenig Schmerzen. Kein Fieber. Am 30. V. Entfernung des Beutels. Wundtrichter schliesst sich langsam.	Im untern Wundwinkel noch granulierender Trichter. Wohlbefinden.	28. VI. 01
29. VI. 01. Salpingoophorectomia dextra. Salpingectomy sin. per laparotomiam. Mikulicz'sche Tamponade. Der mit den umliegenden Därmen verwachsene Tumor tuboov. wird ausgeschält, wobei er berstet und grünlichen dicken Eiter entleert. Die linke, am abdom. Ende verschlossene, stark verdickte Tube wird exstirpiert. Das Ovarium wird belassen. Tamponade nach Mikulicz.	Kein Fieber. Am 5. VII. Entfernung d. Schürze. Wunde granuliert gut.	Wunde im untern Winkel noch leicht granulierend.	11. VIII. 01
8. VII. 01. Hysterectomy vaginalis totalis; Salpingoophorectomia dextra. Die rechten Adnexe sind zu einem kindskopfgrossen, am Netz adherenten Tumor umgewandelt, welcher bei der stumpfen Auslös. platzt und reichlich Eiter entleert. Entfernung d. Uterus und alles Krankhaften. Naht. Jodoformgaze tamponade.	In den ersten Tagen fliesst noch viel eitriges Sekret ab. Später nimmt die Sekretion stetig ab. Kein Fieber.	Vaginaltrichter schön granulierend; darin sitzen noch einige Fäden, die eine eitriges Sekretion unterhalten.	5. VIII. 01

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
7	H.-P. 36 J. Basel Italien	1901 323	II norm.	Seit 1 Jahr bei der Periode jeweils starken Blutverlust, 8–10 Tage lang dauernd. Dabei wehenartige Schmerzen. In der Zwischenzeit kein Blutabgang und keine Schmerzen, dagegen stets wenig schmutzigen, übelriechenden Ausfluss.	Uterus gross, hart; reicht bis zum Nabel. Os extern. für 3 Finger gut durchgängig. Cavum mit weichen Massen angefüllt. R. u. l. Adnexe in wurstförmige, prallelastische Tumoren umgewandelt. Diagnose: Verjauchtes submucöses Myom. Doppelseitige Pyosalpinx.
8	L.-B. 30 J. Hausfrau Basel Bern	1901 342	○	Letzte Periode auffallend stark, 10 Tage lang dauernd, verbunden mit heftigen Krämpfen im Unterleib. Seither blutiger Ausfluss.	Uterus in Anteflexion. Hinter dem Corpus uteri rechts ein weicher, faustgrosser Tumor. Linke Seite frei. Punktion des Tumors ergibt dunkles, flüssiges Blut. Fieber. Diagnose: Haematosalpinx dextra.
9	L.-B. 30 Jahr Hausfrau Basel Bern vide No. 8	1901 243 forts.	○	Seit dem Austritt am 26. VI. (s. o.) abends immer Fieber bis 38,9. Am 8. VII. Schüttelfrost. Tags darauf Eiterdurchbruch in's Rectum. Dann Temp.-Abfall und Besserung. Vom 25. VII. an wieder Temp.-Anstieg. Vom Arzt wird ein kindkopfgrosser fluctuierender Tumor rechts vom Uterus konstatiert.	R. vom Uterus eine kindkopfgrosse, fluctuierende Geschwulst, deren Kuppe bis handbreit über die Symphyse ragt, u. deren unt. Pol den Douglas ausfüllt. Rechte Tube daumendick, geht im Tumor auf. L. ovar. u. Tube nach hinten verlagert und verdickt.
10	R.-H. H. 26 J. Hausfrau Zell i. Wiesen- thal Freiburg i. B.	1901 363	○	Periode in den letzten Jahren schmerzhaft. Vor 8 Jahren Bauchwassersucht. Seither immer Krämpfe im Leib, seit 1 Jahr häufiger und heftiger, zu beiden Seiten im Unterleib. Patientin bemerkt Grösserwerden des Leibes, bes. rechts und links.	Uterus recliniert, anteflectiert. Rechts davon ein faustgrosser, mit d. Längsachse sagittal gestellter, an beiden Enden zugespitzter, prallelastischer Tumor fühlbar. L. ein ebensolcher, etwas grösserer Tumor. Beide Tumoren vom Uterus gut abgrenzbar. Diagn.: Hydro-(Pyo?) salpinx duplex.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
12. VII. 01. Myomectomya totalis per laparotomiam. Salpingoophorectomia duplex. Die Tumoren werden samt dem Uterus ohne Verletzung der ersten entfernt. Während der Operation mehrfach Anfälle von Herzschwäche.	Exitus letalis 12 St. nach der Operation im Collaps.	Lipomatosis universalis. Dilatatio cordis et Myodegeneratio. Milztumor. Fettleber. Parenchym. Nephritis.	12. VII. 01
17. IV. 01. Eröffnung des Abscesses per vaginam. Es entleert sich reichlich stinkender, gelbgrüner Eiter. Auf der Abscesswand fühlt man oben das verdickte Ovarium. Einlegen eines Drainrohres. Jodoformgaze-Tamponade.	Patientin hat stets wenig Ausfluss. Am 25. V. ist an der obern Wand der frühern Abscesshöhle ein neuer prallelast. Tumor fühlbar, welcher eröffnet wird und massenhaft stinkenden Eiter entleert. Drainrohr. Sofort Temperaturabfall.	Abscesshöhle klein. R. oben noch eine kleine druckempfl., fluct. Stelle. Immer noch starke Eitersekretion.	26. VI. 01
2. VIII. 01. Salpingoophorectomia duplex et Hysterectomia vaginalis. Beim Lösen der Adhaesionen reißt der Tumor ein und entleert reichl. Eiter. Linke Adnexe vergrößert u. entzündlich verändert. Tamponade mit Jodoformgaze.	Zweimal Brechen. Fieber. Am 12. VIII. Schüttelfrost. Viel eitriges Ausfluss. Vom 20. VIII. an fieberfrei, Abnahme des Ausflusses.	Fast kein Sekret mehr aus der Scheide fließend.	9. IX. 01
29. VIII. 01. Salpingectomya duplex per laparotomiam. Der linke Tumor, welcher der ausgeweiteten Tube entspricht, kann ohne weiteres luxiert u. am Stiel abgetragen werden. Der rechte Tumor ist in Adhaesionen gebettet und muss gelöst werden. An seiner Kuppe sitzt das Ovarium, das mit entfernt wird. Naht. Verband. Die beiden Tumoren enthalten sterilen Eiter.	Afebril. Am 18. IX. ziemlich resistentes Exsudat rechts vom Uterus zu fühlen. Haematom des Stumpfes. Sonst Verlauf glatt.	Rechts vom Uterus ein cystisches zum Teil derbes, pflaumengrosses Exsudat (Haematom) zu fühlen. — Narbe linear.	21. IX. 01

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
11	J.-F. 23 Jahr Tochter Basel Baden	1901 386	○	Seit Januar Schmerzen in der link. Unterbauch- gegend. Seither keine Periode mehr. Im Früh- jahr Schwellung auf der linken Seite bemerkt. Schmerzen bes. bei der Arbeit und bei Druck. Eine Punktion der An- schwellung ergab nichts. Seit einig. Jahren Fluor. Kein Fieber.	Uterus anteflectiert, et- was hypoplastisch. Links fühlt man einen unebe- nen, höckerigen, ver- schiebbaren, aber mit dem Uterus in Zusam- menhang stehenden Tu- mor. Neben dem Tumor die Tube als fingerdicker Strang fühlbar. Ovarium nicht fühlbar. Rechte Tu- be verdickt. Ovarium vollständig frei. Diagnose: Tumor tu- boovarialis sinister (Pyo- salp. tbc?)
12	N.-L. M. 24 J. Hausfrau Basel Elsass	1901 448	I Kind hatte Oph- thal- mo- bleno- rrhoe	Pat. war vom 26. IV. bis 18. VI. wegen Go- norrhoe und Salpingoo- phoritis gonorrh. sin. im Spital. Wurde gebes- sert entlassen. Einige Wochen nachher krampf- artige stechende Schmer- zen im Unterleib. Perio- de seither sehr stark u. unregelmässig.	Uterus anteflectiert. Aus dem Muttermund schleimig eitriger Aus- fluss. Die linke Tube ist stark verdickt, fluctuie- rend, das Ovarium ver- grössert. Rechte Tube verdickt. Ovarium nor- mal. Diagnose: Tumor tu- boovarialis sin. gonorrh.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
27. IX. 01. Salpingectomy duplex. Ovariectomy sinistra per aparotomiam. Drainage nach Mikulicz. Untere Dünndärme u. Blase untereinander ver- wachsen. Der Darm eisst an zwei Stellen ein und entleert etwas In- halt in die Bauchhöhle. Die rechte fingerdicke Tube wird entfernt, das Ovarium belassen. Linke Tube daumendick; Ova- rium vereitert, daran an- schliessend ein Abscess, der sich bis in den In- guinal-Kanal fortsetzt. Entfernung der Adnexe links. Die Abscessmem- bran kann nicht vollstän- dig entfernt werden. — Paraponade mit Miku- licz'schem Gazebeutel. — Nacht. Verband.	Am 1. X. Entfernung der Schürze. L. fliesst noch ziemlich viel Eiter aus der Wunde; ständig Ausspülungen mit Chlor- wasser. Die Sekretion nimmt allmählig ab. Kein Fieber.	In der Mitte d. Bauch- narbe eine Fistelöffnung, durch die die Sondé 13 cm. tief gelangt. Uterus anteflectiert, tief ste- hend. Links ein knolli- ger, eigrosser Tumor, der in toto beweglich ist.	5. XII. 01
29. XI. 01. Salpingoophorectomia sinistra. Salpingectomy extra. R. Adnexe mit Dünn- darmschlingen verwach- sen. Sie werden von den Adhaesionen befreit und abgetragen; ebenso die rechte krankhaft verän- derte Tube. Die linke Tube enthält dicken Ei- ter; die rechte Blut. — Nacht. Verband.	Leichte Temperatur- steigerung im Beginn we- gen Bronchitis. 9. XII. Entfernung d. Nähte. Wunde p. p. ge- heilt.	Uterus klein, anteflec- tiert. Nirgends ein Ex- sudat fühlbar. Pat. fühlt sich sehr wohl.	23. XII. 01

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
13	E.-M.M. 32 J. Hausfrau Basel Baselland	1902 3	II norm.	Pat. hat schon seit ei- nigen Wochen Schmer- zen im Unterleibe, bes. auf der r. Seite. Stets Fieber. Periode regel- mässig, ohne Molimina. Kein Fluor.	Von aussen über der Symphyse ein höckeri- ger Tumor zu fühlen. Derselbe lässt sich per vaginam gut vom antefl. Uterus abtrennen. Die r. Adnexe gehen in dem Tumor auf. Linke Ad- nexe O. B. Vor dem Ute- rus ein Exsudat fühlbar. Diagnose: Tumor tu- boov. dexter.
14	V.-K. 41 Jahr Wäscherin Basel Basel	1902 29	1 Abort 1 P	Pat. klagt, sie habe die beiden letzten Male bei der Periode starke Schmerzen links im Un- terleib gehabt. Periode war sonst immer regel- mässig und ohne Beson- derheiten. Kein Ausfluss.	Taubeneigrosse Recto- cele. Uterus anteflectiert, stark dextroponiert. Un- mittelbar an ihn an- schliessend auf der lin- ken Seite ein grosser cystischer Tumor, der der linken Uteruskante innig anliegt, bis hand- breit über die Symphy- se ragt. Rechte Adnexe undeutlich. Diagnose: Salpingoo- phoritis abscedens sin.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
21. I. 02. Salpingoophorectomia plex per laparotomi- n. Drainage nach Mi- kulicz. Der grosse Tumor, ei- ne völlig vereiterte Ova- lcyste, ist mit dem oecum u. einigen Dünn- armschlingen verwach- sen. Beim Lösen reisst die erweiterte Tube ein und entleert viel Eiter. In der hintern Blasen- wand erscheint ein Ab- cess, der schon bis zur mucosa vorgedrungen ist. Das linke Ovarium ist in einen cystischen Tumor umgewandelt und wird ebenfalls entfernt. — Revision - Toilette der Bauchhöhle. Mikulicz's- che Tamponade. Naht. im Eiter (Bouillon) prepto- u. Staphylocc.)	Einmal abends 38,5; sonst Verlauf vollkom- men glatt. Entfernung d. Mikulicz'schen Schürze am 27. I. — Wunde gra- nuliert schön; die Naht p. p. geheilt.	Wunde bis auf kleinen granulierenden Trichter geheilt. Uterus frei be- weglich.	3. III. 02
14. I. 02. Salpingoophorectomia plex, abdominalis. Ausschälen der intrali- gamentären Cyste. Drai- nage nach Mikulicz. Der Tumor ist voll- ständig intraligamentär entwickelt. Beim stump- fen Lösen der Adhae- sionen reisst der manns- kopfgrosse Tumor ein u. er entleert sich massen- haft Eiter in die Bauch- höhle. Auslösen der Ab- cessmembran. Da die r. Adnexe entzündl. verän- dert sind, werden sie auch abgetragen. Toilet- te der Bauchhöhle. Drai- nage nach Mikulicz. — Naht. Verband. — Der Eiter erweist sich als tubercul. Diagnose: Tuberc.	21. I. Entfernung des Mikulicz'schen Sackes. Verlauf vollkommen nor- mal. Kein Fieber. Wun- de per primam intentio- nem geheilt.	Noch ein kleiner gra- nulierender Trichter am untern Ende der Narbe.	3. IV. 02

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Parus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
15	M.-H, 29 Jahr Basel Württemberg	1902 79	○	Seit 6 Wochen Klagen über stechende Schmer- zen im Unterleib und Brennen beim Wasserlö- sen. Menses in Ordnung. Stets etwas Fluor.	Uterus anteflectiert, reclinert, virginell. L. vom Uterus ein faustgr. Tumor, von welchem das Ovarium abzutrennen ist. L. Ovarium vergrößert. R. Tube geschlängelt, bleistift dick. R. Ovarium vergrößert. Auf d. Dou- glas'schen Falte Knöt- chen zu fühlen. Auf der r. Falte ein kleiner fluc- tuierender Tumor. Diagnose: Tumor tu- boovar. duplex. Pelveo- cellulitis, Pelveoperiton, tbc.
16	B.-Sp. M. 37 J. Zürich	1902	○	Seit 2 Jahren von Zeit zu Zeit starke krampf- artige Schmerzen im Un- terleib, oft verbunden mit Brechen. Leichter Fluor. In letzter Zeit starke Zunahme der Schmerzen. Menses O. B.	Uterus anteponiert, -flectiert. Im Douglas'- schen Raum ein diesen ganz ausfüllender Tu- mor. R. davon ein zwei- ter, faustgross abgrenz- bar., leicht beweglich. Weiter oben lässt sich ein dritter, von den üb- rigen abgrenzbarer Tu- mor abtasten. Diagn.: Hydrosalpinx dextra. Pyovarium sin. Pelveoperitonitis.
17	Sch. C. 18 Jahr Magd Johannvorst. Elsass	1903 6	○	Im Juni 1902 wegen Sonorrh. hier im Spital. Seither oft Schmerzen bald rechts, bald links im Abdomen. Perioden regelmässig, stark und schmerzhaft. Kein Aus- fluss mehr.	Uterus retroflectiert anscheinend fixiert. L. Ovarium und Tube dicht am Uterus, druckempfl. Rechte Adnexe nicht deutlich zu fühlen. Im Urethral-Schleim keine Gonoconen nachweisbar. Diagnose: Pelogoperi- tonitis chron. gonorrh. Tumor tuboov. sin. Re- trofl. uteri fix.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
14. III. 02. Salpingoophoritis duplex per laparotomiam. Drainage nach Mikulicz. Beim Lösen der zahlreichen Adhaesionen reißt rechterseits ein Eitersack n. Der Eiter ergießt sich in die Bauchhöhle. Extirpation der r. Adnexe. Beim Lösen der l. Adnexe reißt d. Mastarm ein. Naht. — Abtragen der l. Adnexe. Mikulicz'sche Drainage. Naht. Verband.	Nach der Operation tiefer Collaps, aus welchem langsame Erholung. Viel Aufstossen. Radialis. — Puls kaum fühlbar. Hohe Temperaturen. Beim Verbandwechsel riecht der Verband nach Stuhlgang. Am 18. III. Entfernung des Mikulicz'schen Gazebeutels. Spülen mit H²O². — Gegen Mittag plötzlich Verfall u. Exitus.		18. III. 02
10. III. 02. Salpingoophorectomia sinistra. Salpingectomy extra. Drainage nach Mikulicz. Die vorliegenden Därme sind fest miteinander verklebt. Die linke Tube ist zur Hydrosalpinx umgewandelt. Bei der Lösung der l. Adnexe platzt ein Abscess n. l. Ov. u. entleert Eiter in die Bauchhöhle. Abtragen der Adnexe beidseits. Tamponade n. Mikulicz. Naht. Verband.	Verband zweimal fäkalent riechend. Abends dreimal 38,4. Sonst Verlauf normal. 17. III. Entfernung des Mikulicz'schen Beutels. Wunde heilt p. p.	Am untern Wundwinkel noch kleine, granulierende Stelle. Dort eine 4 cm. tiefe, wenig secretzierende Fistel.	21. IV. 02
18. XII. 02. Salpingoovariectomy in. Salpingect. dextr. et vaginam. Uterus retroflectiert, durch alte Adhaesionen fixiert. L. Ovarium cystisch degeneriert. Tube keulenförm. verdickt. Bei der Herausnahme platzt die Cyste und entleert. Eiter. Vesicofixation des Uterus. Naht. Tamponade der Scheide.	Am 1.—3. Tag einige Male Brechen. Abends 38,2—38,4°. Bis zum 9. Tag keine Schmerzen.	Colpotomiewunde geheilt. Auf der l. Seite ein etwa nussgr. nicht empfindl. Infiltrat.	13. I. 03

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
18	V.-V. 33Jahr Hausfrau. Basel Baselland	1903 28	○	Patientin blutet seit einem Monat konstant. Schon seit längerer Zeit Schmerzen im Abdomen, welche sich auf der r. Seite localisierten. War läng. Zeit wegen Blind- darmentzündung in Be- handlung.	Uterus retroflectiert- vertiert. R. ein Tumor von deutlicher Posthorn- form. Von ihm geht ein zweiter Tumor aus, der bis über die Mit- tellinie reicht. Auf der l. Seite sind die Adnexe nicht deutlich zu fühlen. Diagnose: Haemato- salpinx. Pyovarium?
19	J.-G. 29 Jahr Fabrik-Arb. Basel Bern	1903 60	IV.	Am 2. I. Schüttelfrost und starke Schmerzen im Abdomen. Seither wie- derholen sich die Schmer- zen von Zeit zu Zeit. Periode O. B.	Uterus anteponiert, si- nistro-retrovertiert. Lks. vom Uterus ein apfel- grosser, derber Körper, der mit der Uteruskante durch einen ebenfalls derben und fingerdicken Strang (Tube?) verbun- den ist. R. vom Ute- rus ein grösserer Tumor von gleicher Consistenz. Tube scheint normal. Hinter dem Uterus in der Höhe der Portio be- ginnend ein wurstförmiger Tumor, der mit dem rechtseitigen Tumor eng verbunden ist. Diagnose: Tuberculo- se der Adnexe.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
9. I. 03. Salpingoophorectomia duplex per lapar. Der von rechts nach der Medianlinie ziehende, blaurot durchscheinende Tumor platzt bei der Lösung d. Adhaerenzen und entleert dunkles Blut. Bei der Lösung d. Adhaerenzen erscheint auch Eiter. Entfernung der l. Adnexe. Die r. Adnexe sind ebenfalls entzündlich verändert u. werden entfernt. Drainage nach Mikulicz.	Vollkommen glatt, keine Fieber. Am 14. I. Entfernung der Mikulicz'schen Schürze.	Naht p. p. geheilt. Nirgends ein Exsudat.	6. II. 03
29. I. 03. Salpingoophorectomia sin. Salpingectomy dextra per laparotomiam. Beim Versuch, den linksseitigen Tumor aus seinen ziemlich zahlreichen Adhaerenzen zu lösen, platzt derselbe und entleert grünlich-gelben Eiter. Entfernung der l. Adnexe und der kranken rechten Tube. Toilette der Bauchhöhle. Drainage nach Mikulicz. — Naht.	Glatt. Kein Fieber. 3. II. Entfernung der Mik. Tamp. 8. II. Entfernung der Nähte. Wunde pp. geheilt. Wundtricht. granuliert schön. Am 3. III. Wunde vollkommen geschlossen. 13. III. Eintritt der Periode, welche ganz schmerzlos verläuft.	Uterus klein, anteflektiert, wenig beweglich. Nirgends ein Exsudat. Bauchnarbe solid.	24. III. 03

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
20	Th. I. 21 Jahr Fabrikarbeit. Aesch Bern	1903 63	○	Seit 3 Wochen anfall- weise Schmerzen im Ab- domen, mehr rechts, als links, und in der Bla- sengegend. Brennen beim Wasserlassen. Letzte Pe- riode nur zwei Stunden dauernd, sonst immer normal gewesen.	Uterus anteponiert, anteflectiert. Rechts ein rundlicher, verschiebba- rer Tumor mit glatter Oberfläche zu fühlen. L. scheint ein kleinerer Tu- mor tuboovarialis zu lie- gen. Diagnose: Salpingo- oophoritis dextra puru- lenta.
21	L.-B. 31 Jahr Hausfrau Bayern	1903 78	○ 8 Jahr steril.	Seit 8 Jahren steril. Der Mann gibt zu, bei noch nicht geheilter Go- norrhoe geheiratet zu haben. Pat. war vor 14 Tagen an Douglasab- scuss behandelt, entlas- sen worden. Zu Hause wurden die Schmerzen, auf der r. Seite, uner- träglich. Hohes Fieber 39,5—39,8°.	Aus der Vagina fliesst Eiter ab. Rechts vom Uterus nach hinten zu fühlt man einen gut faust- grossen, prallelastischen auf Druck sehr empfind- lichen Tumor. Adnexa nicht abtastbar. Diagnose: Vereiterte gonorrhoeische Ovarial- cyste rechts.
22	St. F. 19 Jahr Schneiderin Basel Bern	1903 94	○	1901 Blinddarmentzün- dung. Seither angeblich beständig die gleichen Schmerzen auf der rech- ten Seite, während der Periode besonders stark fühlen, der sich durch stechend. Die Periode in den letzten drei Viertel- jahren sehr stark und 8—10 Tage dauernd. Nie Fieber.	Uterus klein, virginell. Retroponiert, anteflec- tiert. Im l. Scheidege- wölbe ein höckeriger, kammartiger Tumor zu fühlen, der sich durch die fossa vesico-uterina nach der andern Seite zieht und dort in einem ebensolchen höckerigen Tumor endet. Diagnose: Tumor tu- boovarialis duplex tu- berculosus.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
29. I. 03. Salpingoophorectomia extra. Salpingectomy nistra. Netz mit den Becken- organen verwachsen. Fle- ur mit dem Uterus fun- us und dem rechts von m liegenden Tumor erwachsen. Bei der umpfen Trennung der adhaerenzen und Auslö- ung des Tumors reißt ieser ein und ergießt ellbraunen dünnen Ei- er in die Bauchhöhle. ie linke verdickte Tu- e wird ebenfalls ent- nt. Drainage an Stel- der r. Adnexe nach likulicz. Schluss der auchhöhle bis auf den tern Wundwinkel.	Kein Brechen; kein Fieber. 3. III. Entfer- nung der Tamp. 5. III. Entfernung des Beutels. Dieser riecht fäkulent. Bact. coli und Pyocyan. Wirkung sichtbar. Spü- lung der Wunde mit es- sigsaurer Thonerde. 8. III. Darmfistel offenkun- dig. Es fließt breiiger, dunkler Stuhl ab. Stich- kanaleit. Entf. ein. Nähte. Tägl. Spülung der Wun- de. Lockere Tamponade. Stets weniger Stuhlaus- der Wunde. Wundtrich- ter wird enger und rei- nigt sich gut. — 26. III. Eintritt d. Periode; ver- läuft schmerzlos. Wund- trichter noch 3 cm. tief. Keine Sekretion mehr. Pat. nimmt an Gewicht stets zu.	Laparotomiewunde fest vernarbt. Nirgds. Druck- empfindlichkeit. Uterus normal; wenig beweg- lich, anteflectiert.	3. IV. 03
2. II. 03. Punktion. Eröffnung d. bscesses. Drainage. Vom hintern Schei- engewölbe aus wird mit ner Punktionsnadel in en Tumor eingestochen. s entleert sich serös- trige Flüssigkeit. Er- eiterung d. Punktions- ffnung und Einlegen ei- es Drains.	Sofort Temperaturab- fall. Abends 38,0. Spä- ter immer unter 38,00. Der Ausfluss nimmt täg- lich ab. Die Schmerzen haben mit der Operation aufgehört.	Rechtes Ovarium hüh- nereigross, hart, nicht druckempfindlich. Fistel- öffnung geschlossen.	3. III. 03
12. II. 03. Salpingoophorectomia uplex. Amputatio uteri ipravaginalis per lapa- tomiam. Die Organe des klei- en Beckens sind sämt- liche fest mit einander erbacken. Die Ovarien nd beide hühnerei- gross, stark verdickt. ei der stumpfen Tren- ung der Adhaerenzen ntleert sich Eiter in die auchhöhle. Der Uterus uss mit den Adnexen i toto entfernt werden. amponade nach Miku- cz. Naht.	Kein Erbrechen. 15. II. Entfernung des Tamp., 17. II. Entfernung der Schürze. Mässig starke Sekretion. Die Fistel schliesst sich bald. Auf- treten heftiger Schmer- zen beim Wasserlösen. Die Fistel bricht wieder auf und entleert viel Ei- ter. Spülungen.	Auf der linken Seite noch wallnussgrosser Tu- mor.	28. XII. 03

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
23	G.-M. 25 Jahr Hausfrau Basel Baselland	1903 162	II	Die zwei letzten Perioden waren schmerzhafter als gewöhnlich. In d. Intervallen Schmerzen auf der linken Seite, die in's linke Bein ausstrahlen.	Uterus nach rechts verlagert durch einen kleinkindskopfgross. Tumor, welcher fluctuiert. Consistenz weich. Tumor scheint von der Tube auszugehen. Ovarium nicht deutlich abtastbar. R. Adnexe leicht vergrössert, druckempfindl. Diagnose: Tumor tuboovari- alis sin. Salpingoophoritis dextra.
24	J.-St. 31 Jahr Hausfrau Basel Baselland	1903 182	I.	Seit der Geburt vor 4 Jahren Schmerzen im Kreuz und Unterleib auf beiden Seiten, die sich bei körperl. Anstrengungen verschlimmern; von der Periode unabhängig.	Uterus recliniert, anteflectiert, descendiert auf dem Beckenboden. R. im Douglas ein stark fluctuierender, wahrscheinlich aus Tube und Ovarium besteh., grosser Tumor. L. ein sehr empfindlicher, kleinerer Tumor tuboovari- alis. Diagnose: Descensus uteri. Tumor tuboovar. duplex.
25	V.-G. 29 Jahr Hausfrau Gr. Hünningen Elsass	1903 201	3 Jahr steril verh.	Seit 3 Monaten leidend. Immer heftiger werdende Krämpfe im Unterleib, am stärksten bei Bettlage. Periode O. B. Nie Ausfluss.	Uterus normal gross, antefl., retroponiert, wenig beweglich. L. fühlt man einen Tumor von Apfelgrösse u. verschiedener Consistenz. Rechts ein grösserer, aus zwei kleinen zusammengesetzter, cystischer Tumor. Von dem Tumor aus ziehen gegen das Promontorium hin kammartige Exsudatmassen von sehr derber Consistenz. An der r. Tube einige harte Knötchen. Diagnose: Salpingoophoritis dpl. tbc.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation.	Entlassungsstatus	Austritt
6. III. 03. Salpingoophorectomia plex per lapar. Der dem Ovarium u. er Tube angehörende tumor links ist nicht erwachsen mit der Um- gebung. Beim Heraus- ziehen platzt er und entleert dünn-flüssigen Eiter. Die Adnexe wer- den beidseits abgetra- gen. Auf Drainage der Bauchhöhle wird ver- sorgt. Schluss d. Bauch- höhle.	Glatte Verlauf. Nie Brechen. Kein Fieber. Wunde p. p. Narbe so- lid. Nirgends Druckem- pfindlichkeit.	Uterus anteflectiert, beweglich. Kein Stumpf- exsudat. Keinerlei Be- schwerden. Bauchnarbe fest.	7. IV. 03
2. IV. 03. Totalexstirpation des uterus und der Adnexe per vaginam. Beim Herunterziehen der lospräparierten lin- ken Tube reißt diese in und entleert dünn- flüssigen, gelblichen Ei- ter. Auch der Tumor auf der r. Seite reißt in und entleert Eiter. Spülung mit Borwasser. Abtragung der Adnexe per ovariogazetamponade der Bauchhöhle und d. Scheide.	Glatte Verlauf. Kein Fieber.	Scheidentrichter schön granulierend. Nirgends Exsudat.	31. IV. 03
14. IV. 03. Totalexstirpation des uterus mit den Adnexen (Except. ov. sin.) per va- ginam. Mediane Spaltung des uterus; Herausnahme d. Tube, die stark ver- dickt und schwer aus der Umgebung zu lösen ist. Entfernung der bei- den Uterushälften. Der grosse rechtsseitige Tu- mor wird aus seiner Umgebung ausgeschält. Dabei fließt etwas übel- riechender Eiter heraus. Einnähen d. Plicastum- mes in die Scheide. Tam- ponade der Perit.-Höhle mit zwei Mähen.	Abends 38,0°. Urin u. Winde spontan. 19. IV. Entfernung eines Tam- pons, der schwarz ver- färbt ist und übel riecht. 20. IV. 2. Tamp. heraus. Nachts heftige Schmer- zen. 38,5° ohne nach- weisbare Ursache. 27. IV. Nähte entfernt. Al- les i. O.	Allgemeinbefinden gut. Wunde im Scheidenge- wölbe granuliert noch an einigen Stellen. Kein Stumpfxsudat.	6. V. 03

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
26	K.-Sch. 30 J. Hausfrau	1903 245	O. P.	Seit längerer Zeit Aus- fluss. In den letzten Wo- chen an Stärke stets zu- nehmende Schmerzen im Unterleib links. Menstru- ation nicht verändert.	Scheide eng. Stark eit- riger Ausfluss. Ut. an- tefl., dextropon., klein, bis zur Hälfte der Hin- terfläche abgrenzb. Von da aus geht ein Kamm, d. auf einen Tumor von Orangegröße zuläuft. Der Tumor geht bis zur linken Beckenwand und ist in toto etwas be- weglich. R. Tube ange- schwollen. Ovar. scheint normal zu sein. Diagnose: Tumor tu- boovarialis sin.
27	C.-A. 37 Jahr Hausfrau	1903 259	I.	Schmerzen im Unter- leib seit 8 Tagen, rechts und in der Mitte, die sich so sehr steigerten, dass Pat. das Bett nicht verlassen konnte. Aus- fluss soll nie bestanden haben. Periode stets re- gelmässig und ohne Be- schwerden.	Uterus gross, dick, an- teflectiert. L. Ovar. an der Beckenwand frei be- wegl. L. Tube etwas ver- dickt. R. Ovar. und Tu- be bilden einen Tumor der den Uterus über- ragt. Diagnose: Pyosalpinx duplex. Pyovarium dex- trum.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
26. V. 03. Salpingoophorectomia duplex per vaginam mit Uterusexstirpation. Spaltung des Uterus. Heraushohlen der linken Adnexe, wobei ein Eitersack platzt und plötzlich viel dickflüssiger Eiter in der Vagina erscheint. Abtragen der l. u. r. Adnexe, welche letztere ebenfalls erkrankt sind. Einnähen d. Stümpfe in die Scheide. Naht. Tamponade der Bauchhöhle.	Mehrm. Brechen. Katheterismus. Am 2. Tag kein Brechen mehr; Schmerzen im Leib. Katheterismus. Urotropin. Urin spontan. Entfernung der Tamponade. 6. VI. Entfernung d. Nähte. Wohlbefinden.	Im Grunde der Scheide ein granulierender Wundtrichter. Nirgends ein Exsudat oder Druckempfindlichkeit.	9. VII. 03
19. V. 03. Salpingoophorectomia per lapar. Därme und Netz sind z. T. mit den Beckenorganen verwachsen. Beim Lösen einer Darmschlinge wird ein Abscess eröffnet, der zwischen den Adnexen, Blase u. Darm lag. Es entleert sich grünlich, stinkender Eiter aus demselben. Resectieren der Adnexe auf beiden Seiten. Drainage d. Bauchhöhle nach Mikulicz.	23. V. Entfernung d. Tampons. Einführen eines neuen. Katheterismus. Kein Fieber. 5. VI. Urin spontan. 6. VI. Phlebitis 38,2°. Wundtrichter schliesst sich langsam, secerniert. Täglich Spülungen mit H²O².	Allgemeinbefinden gut. Noch 3 cm. tiefer, wenig secernierend. Wundtrichter. Leib weich, nirgends Druckempfindung.	11. VII. 03

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
28	G.-B. 34 Jahr Regensdorf Elsass	1903 285	2	War 1902 wegen einer Geschwulst im Unterleib konservativ behandelt worden. Da die Schmerzen sich steigerten und Patientin das Bett hüten musste, will sie sich operieren lassen.	Uterus tiefsteh., nach hinten verlagert, druckempfindlich. Rechts davon ein mandarinengr. Tumor. Diagnose: Tumor tuboov. dext.
29	T.-M. 32 Jahr Hausfrau Basel Solothurn	1903 315	2	Vor fünf Monaten Schmerzen im Unterleib, die während der Periode sehr heftig wurden. Nach der Periode verschwanden die Schmerzen und kamen nicht wieder bis vor 14 Tagen. Vor 8 Tagen trat die Periode ein und die Schmerzen wurden unerträglich.	Uterus dextro-, antepioniert. R. vom Uterus geht ein harter praller Tumor ab, der bis an die Beckenwand reicht. Links ein grösserer, etwas verschiebbarer Tumor. Beide Tumoren drängen sich hinter dem Uterus zusammen. Beckenbindegewebe hart, infiltriert. Punktion ergibt Eiter. Diagnose: Pyosalpinx. Pyovar. dupl. Pelveoperitonitis.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
30. V. 03. Totalexstirpation des Uterus mit den Adnexen. Spaltung der vordern und der hintern Uteruswand. Die linken Adnexe, die ebenfalls krankhaft verändert sind, werden entfernt. Beim Versuch, den Tumor der r. Seite stumpf auszuschälen, platzt er und entleert gelblichen übelriechenden Eiter. Borspülung. Entfernung der Geschwulst im Zusammenhang mit dem Uterus. Die r. Tube ist in einen länglichen, wurstförmigen Tumor verwandelt und wird stumpf ausgelöst. Einlegen einer Mëche in's Peritoneum.	Urin spontan. Am 31. V. starke Schmerzen im Unterleib. Winde und Stuhl spontan. Zerfall. 10 h p. m. Exitus.	Sektion verweigert.	31. V. 03
27. VI. 03. Totalexstirpation des Uterus mit den Adnexen per laparotom. Därme nicht verwachsen. Beim Loslösen des linken Tumors von der Plica ovario-pelv. reißt derselbe ein und ergießt massenhaft dicken gelben Eiter. Der r. Adnextumor wird ebenfalls beim Lospräparieren eingerissen, ebenso ein Douglasabscess. Entfernung der Tumoren mit dem Uterus. Tamponade n. Mikulicz. Naht. Verb.	Sofort nach der Op. ist Patientin collabiert. Puls klein, 140. Abends Puls unfühlbar. Zeitweise heftige Dyspnoe. 7 h. p. m. Exitus.	Sektion verweigert.	27. VI. 03

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Parus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
30	K.-J. 45 Jahr Hausfrau Neu- Allschwyl Baselland	1903 402	o	Die letzten Perioden folgten sich in Intervallen von 2—3 Wochen, waren schmerzhaft, nicht besonders stark. Seit 5 Tagen Schmerzen im Unterleib, Brennen beim Wasserlösen. Fieber.	Durch die Bauchdecken ein dem im 6. Monat schwangern Uterus gleichender Tumor von prall-elast. Consistenz. Portio auf dem Beckenboden. Uterus recliniert, sinistroniert. Vor demselben und hinter der Symphyse ist der von Aussen durchgetastete Tumor zu fühlen. Er ist auf Druck empfindlich und zeigt deutlich Fluctuation. Adnexe nicht fühlbar. Diagnose: Ovarialcyste rechts.
31	Z.-M. 38 Jahr Köchin Basel Bern	1903 420	2	Vor 6 Wochen plötzlich zuckende, stechende Schmerzen im Unterleib; Fieber und blutigen Ausfluss. Auf Bett-ruhe verschwanden die Schmerzen. Seit 14 Tagen wieder Schmerzen u. verdicken gelben eitrigen Ausfluss.	Uterus anteflectiert, etwas verdickt; aus der Cervix starker, eitriger Ausfluss. L. Ovar. wallnussgross. empf. R. ein hühnereigr., cystischer Tumor, etwas adhaerent. Tuben besonders verdickt. Diagnose: Pyosalpinget ooph. dupl.
32	A.-M. 32 Jahr Hausfrau Baselland Baden	1903 447	5	Vor 8 Wochen traten Schmerzen im Unterleib auf. Pat. lag seit 5 Wochen im Bett; machte Spülungen und Sitzbäder ohne Erfolg.	Uterus recliniert, retrovertiert, durch einen Tumor stark nach rechts verschoben. Links ein über orangegrosser fluctuierender Tumor. Diagnose: Tumor tuboov. sin.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
20. VIII. 03. Ovariectomia dextra per laparotom. Die Geschwulst ist umfangsum durch leicht trennbare Adhaerenzen mit der Bauchwand ver- wachsen. Bei der Tren- nung reisst dennoch die Cystenwand ein und es entleert sich sehr viel dünnflüssiger, grünlich-gelber Eiter in die Bauchhöhle. Spülung der Periotomal- höhle. Nach Auslösung der Cystenwand noch- mals Spülung. Tampona- de der r. Beckenhälfte nach Mikulicz. Naht. Verband.	Am 1. u. 2. Tag fühlt sich Pat. rel. wohl. Stuhl u. Winde gehen ab. Ge- gen Abend des 2. Tages wird der Puls klein und frequent, nicht mehr zählbar. Temp. 39,4. Kein Brechen, kein Aufstos- sen. Am 3. Tag plötzlich Verfall und Exitus.	Anat. path. Diagnose: 23 VIII. 03 Peritonitis fibrinosa Cys- tis purul. ov. sin. Dege- neratio parenchymatosa et lipomatosis Cordis destr.	
5. IX. 03. Salpingoophorectomia bilateralis per lap. S. Rom. hängt mit dem linksseit. Tumor zu- sammen; Auslösen des Tumor tuboovariäls aus den flächenhaften, leicht trennbaren Adhaerenzen. Beim Lösen platzt ein kleiner Abscess. Abtra- gung der Adnexe beid- seits. Naht.	Am folgenden Morgen 39,0. Viel Aufstossen, kein Brechen. 8. IX. kein Stuhl, keine Winde, u. mehrm. Brechen. Abend- temp. 36,6. Leib weich. Auf Laxans reichl. Stuhl. Verlauf von da an glatt.	Uterus anteflect. Nir- gendes Exsudat. Narbe p. p. geheilt.	30. IX. 03
28. IX. 03. Punktion. Drainage. Eröffnung des Absces- ses, vom hintern Schei- dengewölbe aus, ent- leert sich viel eitriges Sekret. Drainage mit T- Gummi-Drain.	Anfangs jeden Tag weniger Sekretion. Fie- ber bis auf 39,2. Dann bildet sich über dem l. Poup. Bande eine Vor- wölbung, welche inci- diert wird und Eiter ent- leert. Sofort Temp.-Ab- fall. Normaler Verlauf.	Uterus recliniert, re- trovertiert. L. ein wall- nussgrosser Tumor an d. Beckenwand. Fistel ge- schlossen. Incisionswun- de eingezogen, von ei- ner schmalen trockenen Borke belegt.	22 X. 03

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
33	J.-E. 36 Jahr Hausfrau Elsass	1903 497	9	Vor 2 Monaten be- gann blutiger, übelrie- chender Ausfluss, der bis vor 14 Tagen anhielt. Vor 14 Tagen Schüttel- fröste. Schmerzen und häufig wehenart. Kräm- pe. Kein Blutabgang mehr. Menses sonst im- mer regelmässig.	Uterus anteflectiert; im Abdomen fühlt man einen rundlichen Tumor, hauptsächlich links lie- gend u. mit einem Fort- satz nach der Mittelli- nie reichend. Der Tu- mor liegt hinten auf dem Beckenboden auf. Diagnose: Tumor tu- boov. sin.
34	K.-Sch 37 J. Hausfrau Basel Bern	1904 1	1 Abort	Vor 4 Monaten, nach öfters vorausgegan- nem Stechen, plötzlich sehr heftige Schmerzen r. im Unterleib, wäh- rend 3 Wochen andau- ernd. Fieber bis 40°. Durchbruch von Eiter in die Blase. Dann nach 4 Wochen wieder massen- haft Eiter im Urin. Stets Fieber und Schmerzen. Seither alle 3—5 Tage dicken trüben Urin.	Scheide doppelt. R. Hymen erhalten. Rechts fühlt man eine Masse, die dem Ovar. und der Tube entspricht. Deutl. Fluctuation. Links Tube und Ovarium auch ver- dickt. Diagnose: Tumor tu- boovar. dupl.
35	H.-K. 33 Jahr Wäscherin Basel Baden	1904 4	3	Seit einigen Wochen Kreuzschmerzen. Vor 14 Tagen plötzlich starke Blutung Coagula und Fetzen gingen ab. Einige Tage darauf mehrmals Schüttelfröste. Heftige Schmerzen im Unterleib rechts. Mehrm. Brechen. Pat. verliert andauernd Blut.	Mm geschloss. Uterus anteflectiert, etwas nach links liegend. Rechts v. Uterus parallel d. Pou- part'schen Bande ver- läuft ein Tumor von wurstförmiger Gestalt u. ca. 3 Finger Breite. L. Ovarium frei beweglich. Diagnose: Extrauterin gravidität.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
14. IX. 03. Salpingoophorectomia uplex. p. I. Loslösen des Tumors on seinen leichten Ad- haerenzien. Beim heraus- ziehen platzt ein klei- ner Abscess und entleert etwas Eiter in d. Bauch- höhle. Abtragen des Tu- mors und der rechtssei- tigen, entzündl. veränd. Adnexe. Schluss d. B. H.	Vollkommen glatt. Nie Fieber. Noch hier und da Schmerzen im Abdomen.	Portio hochsteh. Nir- gends Exsudat. Laparo- tomiewunde fest, glatt.	19. X. 03
4. II. 04. Salpingoophorectomia uplex per laparotom. Beim Öffnen des Pe- ritoneum liegt hinter d. Blase ein kleinfistulöser, mit der Umgebung fest verwachsener Tu- mor, d. stumpf lospraep. wird. Bei m Durchtren- nen von knorpelhaften Adhaesionen, die den Tu- mor noch im Becken festhalten, platzt dersel- be und entleert stinken- den Eiter. Linke Tube zeigt sich etwas verdickt. Abtragen d. Adnexe bds. in das Wundbett rechts wird ein Mikulicz-scher Beutel eingelegt und die Bauchwunde bis auf den intern Wundwinkel ver- näht.	Am ersten Tag starke Schmerzen und Brechen. Am 6. II. Entf. d. Gaze, am 10. II. des Beutels. Spülung mit H² O². Am 15. und 16. II. leichte Temp.-Steig. Beim Spü- len gehen etwas Fäces ab. Später keine Kla- gen mehr. Normale Tem- peraturen. Wundtrichter granuliert gut.	Wundtrichter fast völ- lig geschlossen. Vom Rektum aus fühlt man auf der rechten Seite eine starre pelveo peri- tonitische und pelveocel- lulitische Infiltration.	17. III. 04
24. XI. 03. Salpingoophorectomia extra p. lapar. In der rechten Becken- hälfte bilden Ovar., Tu- be und Därme eine zus- ammenhängende Masse. Im Zenitum derselb. fühlt man deutl. Fluctuation. Beim Versuch, die Adhaesio- nen zu trennen, reißt ein Abscess ein und entleert dünnen Eiter. Abtragung der Adnexe rechts. Die linken Adnexe sind un- verändert u. werden belassen. Tamponade nach Mikulicz. Näht der Bauchwunde bis zum unteren Winkel.	Abends 38,6. Sonst nie Fieber. In den 2 näch- sten Tagen häufig Bre- chen. Nach Stuhl u. Win- den hört dasselbe auf. Am 28. XI. Wechsel des Tampons, der fäkalent- riecht. 1. XII. Entfer- nung des Beutels. Dabei tritt etwas Blut aus. Spülung mit H² O². Kei- ne Temperaturerhöhung. Verlauf von da an gut.	Uterus anteflect., frei- beweglich. Kein Exsu- dat.	12. I. 04

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
36	Z.-G. 33 Jahr Hausfrau Baden Baden	1904 11	5	Seit $\frac{3}{4}$ Jahr klagt Patient über Schmerzen zu beiden Seiten im Unterleib. Machte seither einen Abort durch, nach welchem die Schmerzen speziell auf der linken Seite wieder stark einsetzten. Seit 1 Jahr gelben Ausfluss.	Uterus klein, anteflectiert, frei beweglich. R. Tube frei, vielleicht etwas vergrößert. Links ein Kleinkindskopfgross. Tumor an d. Seitenkante des Uterus. Derselbe ist ziemlich gut beweglich, rundl., hinten mit der Beckenwand verwachsen. Consistenz hart. Diagnose: Tumor tuboovariäls sin.
37	A. Br. 22 Jahr Buchhalterin Basel Bayern	1904 24	○	Vor zwei Mon. heftige Schmerzen im Kreuz und in der Lendengeg. Fieber. Oeffters Brechen. Einmal entleert sich mit dem Urin viel Eiter und Blut. Urin seither immer trüb. Wenig Schmerzen mehr.	Aus der Vagina tritt Eiter aus. Uterus anteflectiert, sinistroponiert. Rechts ein faustgrosser Tumor von prallelast. Consistenz, der mit der untern Kuppe in's Scheidengewölbe hinabreicht. Adnexe nicht abzutast. Links ein kleiner Tumor tuboovar., der adhaerent ist. Diagnose: Tumor tuboovar. duplex.
38	Sch.-St. 32 Jahr Hausfrau Basel Baselland	1904 57	4	Vor 14 Tagen Krämpfe im Unterleib, Schüttelfröste. Auf Bettruhe gingen die Schmerzen zurück, bis sie vor 2 Tagen wieder und heftiger auftraten. Viel Brechreiz. Starker Fluor.	Uter. anteponiert-flectiert. Im Douglas ein weicher Tumor zu fühlen, der kammartig nach dem Beckenausgang vorspringt. Punktion d. Tumors ergibt Eiter, der sich als steril erweist. Diagnose: Tumor tuboovariäls.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
17. XII. 03. Vaginale Totalexstir- ation mit Entfernung d. nken Adnexe. Spaltung des Uterus u. Abtragen der r. Uterus- hälfte. Freipraep. des Tumor aus seinen Ver- wachsungen mit den Fin- ern. Dabei platzt er u. entleert reichl. eitrigen inhalt. Abtragen der l. uterushälfte u. des Tu- mors. Einnähen des Pe- ritoneum in die Vag.- wände. B. H. wird of- fen gelassen u. tamp.	Einmal Brechen. Ziem- lich viel Blutabgang. Am 23. XII. abends 38,4. — Täglich Sublimatspülun- gen. Pat. erholt sich gut. Verlauf nun vollkommen normal.	Nirgends ein Exsudat.	3. II. 04
26. XII. 03. Vaginale Totalexstir- ation mit Entfernung d. Adnexe. Spaltung des Uterus. Beim Herunterziehen der rechten Ut.-Hälfte fließt etwas klare, mit Blut gemischte Flüssigkeit ab. Herausholen der Adnexe sehr schwierig wegen d. vielen Verwachsungen. Links wird dabei ein tu- moovar. Abscess eröff- net. Spülung der Perit- höhle. — Rechts wird ebenfalls ein Abscess er- öffnet. Abtragen beider Uterus-Hälften mit den Adnexen. Austamponie- ren der Wundhöhle.	Einmal 39,2. Bei Va- ginal-Spülungen gehen schleimige, übelriechen- de Fetzen ab; darauf nie mehr Temp.-Steigerung.	Noch geringer Aus- fluss. Keine Schmerzen mehr.	20. I. 04
12. I. 04. Vaginale Totalexstir- ation mit Entfernung d. Adnexe. Spaltung des Uterus in zwei Hälften. Los- praep. der einzelnen Ut.- hälften mit den stark mit der Umgebung ver- wachsenen Adnexen. Die Tube ist gut finger- dick, die linke 2fg.-dick. Beide eiterhaltig. Tamp. B. H.	Vollkommen glatter Verlauf. Nie Fieber.	Nirgends ein Exsudat.	10. II. 04

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
39	G.-B. 51 Jahr Partikularin Basel Basel	1904 113	○	War früher schon Unterleibsleidend. Seith. immer Schmerzen rechts im Unterleib u. im Kreuz. Vor 4 Tagen plötzlich starker eitriger Ausfluss und verm. Schmerzen.	Uterus retrovertiert. R. ein grosser rundlicher Tumor, der den Beckeneingang mehrere Finger überragt, frei beweglich. Im Douglas Reste eines Exsudates. L. ein Wallnuss grosser Tumor. Diagnose: Tumor tuboovar. duplex.
40	U.-St. 27 Jahr Hausfrau Basel Basel	1904 118	3	Vor 5 Wochen plötzl. Erkrankung mit Schmerzen im Unterleib, zuerst rechts, dann im ganzen Leib. Brechreiz und Fieber. Auf Bettruhe Besserung. Ziemlich starker Fluor.	Uterus sin.-anteflect., und verdickt. Auf der link. Seite ein hühner-ei grosser, freibeweglicher Tumor tuboovar. Rechts ein kleinerer, etwa wallnussgrosser Tumor tuboovari- Diagnose: Tumor tuboovar. duplex.
41	J.-B. 42 Jahr Fabrikarbeit. Basel Italien	1904 304	2 P	Seit 2 Monaten Periode alle 14 Tage mit sehr starken Beschwerd. Zwischen hinein kein Fluor.	Uterus anteflectiert. L. davon nahe der Kante ein kleinkindskopfgross. Tumor, über d. Beckeneingang ragend, beweglich, fluctuierend.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
18. II. 04. Vaginale Totalexstirpation mit Entfernung d. Adnexe. Spaltung des Uterus. Auflösen des Tumors r. aus seinen Adhaesionen, wobei derselbe platzt u. eitrigen Inhalt entleert. Abtragen des ganzen Uterus mit dem Tumor u. den ebenfalls kranken l. Adnexe. Spülung der B. H. mit H ² O ² . — Tampon. d. B. H.	Puls stets sehr klein, an der Radialis kaum fühlbar. Viel Aufstossen. Abdomen schmerzhaft. Tags darauf Puls unfühlbar. Exitus.	Sektion verweigert.	19. II. 04
22. II. 04. Vaginale Totalexstirpation mit Entfernung d. Adnexe. Spaltung des Uterus. Beim Hervorziehen des linksseit. Tumors platzt derselbe und entleert dicken, gelbgrünen Eiter. Spülung der Bauchhöhle mit Borwasser. Abtrag. l. Ut. u. d. rechtsseit. Tumors. Tamp. d. B.-H.	Vollkommen glatter Verlauf. Nie Fieber.	Wunde granul. schön. Keine Beschwerden.	20. III. 04
16. VI. 04. Salpingoophorectomia duplex per laparot. Die Tumoren sind durch periton. Adhaesionen mit der Umgebung vielfach verlötet. Die Lösung gelingt leicht. Bei der Abtragung platzt der linke Tumor u. entleert eitrigen Inhalt in's kleine Becken. Auch rechtsseit. platzt die brüchige Wand des Tumors. Abtragen d. Adnexe bds. Foilette der Bauchhöhle. Tamponade nach Mikulicz. Schluss der Wunde bis zum untern Winkel.	Kein Brechen. 22. VI. Entfernung des Mikulicz. Kein Fieber. Wundtrichter wird allmählig kleiner. Sekretion gering. Wohlbefinden.	Laparotomiewunde geheilt. Wundtrichter noch Bleistiftdicke weit. Nirgends ein Exsudat. Douglas vollständig frei.	28. VII. 04

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
42	B.-L. 42 Jahr Fabrikarbeit. Basel Zürich	1904 386	4	Seit ca. 8 Wochen fast jed. Abend heft. Kreuz- schmerzen. Hie und da auch Schmerzen im Un- terleib. Kein Fluor. Pe- riode O. B. Nie Fieber.	Uterus recliniert. L. vom Uterus fühlt man einen gänseeigrossen, mit dem Uterus durch einen Stiel verbundenen, frei- beweglichen, mässig der- ben Tumor. R. vom Ut., an dessen Seitenkante anschliessend ein etwas grösserer Tumor mit ge- ringer Verschieblichkeit. Resistenz wie beim Tu- mor der l. Seite. Beide Tumoren sind gut cir- cumscripirt. Diagnose: Tumor tu- boov. duplex.
43	D.-Z. 39 Jahr Hausfrau Basel Elsass	1904 390	3	Vor 3 Monaten plötzl. heft. Schmerzen im Un- terleib links, die nach 3 Tagen verschwanden, bald aber wieder auftra- ten und zur Zeit der Menses sich stark stei- gerten. Grüngelb. Fluor. Wasserbrennen.	Uterus anteflectiert. L. davon ein hühnereigr. gut circumscripirt Tu- mor von unregelmässi- ger Oberfläche. Darüber- hinweg läuft ein blei- stiftdicker Strang. Gono- coccenbefund positiv. — R. Tube etwas verdickt, ebenso r. Ovarium. Diagnose: Tumor tu- boov. duplex.
44	G.-G. 42 Jahr Hausfrau Basel Basel	1904 433	6	Seit 12 Jahren infolge einer nach Geburt auf- getretener Oophoritis go- norrh. hie und da Un- terleibs-Schmerzen, die auf Bettruhe stets ver- schwanden. Seit 5 Wo- chen heftigere Schmer- zen im Unterleib, ver- bunden mit Blutabgän- gen. Temperatur zwis- schen 38,0 und 40°. Seit 8 Tagen kein Blutver- lust mehr.	Uterus sinistro- retro- flectiert. Auf der rech- ten Seite ein gänseeigros- ser Tumor, der fluc- tuiert. Linke Adnexe druckempfindl., aber an- scheinend nicht wesent- lich verändert. Diagnose: Pyosalpinx?

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
10. VIII. 04. Salpingoophorectomia upl. per laparot. Alle Organe des klei- nen Beckens sind fest miteinander verwachsen. Die Auslösung der Tu- moren, Pyovarium und Mesosalpinx gelingt nicht, ohne Einreissen d. Wan- dung und aus beiden Tu- moren entleert sich dicker, übelriechender Eiter. Die Wandungen der Tu- moren werden entfernt. Toilette d. Bauchhöhle. Tamponade nach Mikulicz. — Naht bis z. internen Wundwinkel. —	15. VIII. Entfernung d. Tampons, 17. VIII. des Beutels. Am Abend 38,0 — Wunde p.p. Am 22. VIII. zieml. starke Sekre- tion aus dem Wund- trichter. Temperat. 38,5. — Links i. d. Bauchwand ein kleiner Abscess, der eröffnet wird. Von da ab Verlauf glatt.	Wunde linear geheilt. Am untern Winkel noch 20 Cts.stück grosse granu- lierende Stelle. Kein Stumpfsudat. Vollst. Wohlbefinden.	22. IX. 04.
19. VIII. 04. Salpingoophorectomia pl. per laparot. Beckenorg. zeigen diffuse Verwachsungen. B. Frei- legen der Adnexe rech- terseits platzt beim Lö- sen der Adhaerenzen an der Hinterseite des Lig. mentum eine kleine Ab- senkungs- und entleert sich. Abtragung der Ad- nexe beids. — Tampona- de der Bauchhöhle. — Naht.	Kein Fieber. — Am 26. VIII. Entfernung der Mäcken. Dahinter star- ke Sekretretention, die sich nach Aussen entl. Täglich Mäckenwechsel. Reichlich Sekr. Lungen- embolie 2 W. p. op.	Laparotomiewunde li- near geh. Kein Stumpf- exsudat. Patient völlig beschwerdefrei.	30. IX. 04
12. IX. 04. Salpingoophorectomia duplex per laparot. Die r. Adnexe bilden einen gänseeigrossen, re- bortenförm. Tumor, der durch Adhaesionen all- seitig etwas verklebt ist. Die Adhaesionen werden gelöst, der Tumor vor- gewälzt, wobei er platzt und Eiter in die Becken- höhle ergiesst. — Ab- tragung des Tumors, so- wie der endzündlich ver- änderten linksseitig. Ad- nexe. Toilette der Bauch- höhle. Schluss der Bauch- höhle. — Verband.	Die drei ersten Tage n. d. Operation abends 38,2, sonst nie Fieber. Verlauf vollkomm. glatt.	Laparotomiewunde p. p. — geheilt. Uterus re- troflektiert, nirgends Ex- sudat. Wohlbefinden.	22. X. 04

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
45	K.-M. 22 Jahr Cigarrenarb. Basel Deutschland	1904 530	1	Vor 4 Woch. Schmer- zen im Unterleib rechts. In den letzten 14 Tagen Zunahme derselben, so- dass Pat. nicht mehr si- tzen kann. Seit 2 Tagen eitriger Ausfluss.	Uterus anteflect., nach links verdrängt durch einen ihm anliegenden orangegrossen Tumor. R. Tube scheint in den Tumor überzugehen. Diagnose: Pyovarium dextr.
46	Th. F. 25 Jahr Cigarrenarb. Elsass Elsass	1905 59	○	Seit 14 Tagen Schmer- zen im Unterleib, bes. links. Oft verbreiten sich die Schmerzen im ganzen Unterleib. Seit 2 Tagen bricht Pat. alles, was sie zu sich nimmt. Urinie- sen schmerzhaft.	Dämpfung in den ab- hängigen Partien d. Lei- bes. Uterus stark ante- flectiert, dextroponiert. Auf der l. Seite fühlt man die Tube als wurst- förmigen Strang. Gegen das abdominale Ende zu stark sackförmig erwei- tert. Daneben das leicht verdickte, unbewegliche Ovarium. R. Tube leicht verdickt, ebenso das ad- haerente r. Ovarium. Diagnose: Salpingo- oophoritis d. Sactosalpinx sin.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation.	Entlassungsstatus	Austritt
11. XI. 04. Salpingoophorectomia supl. Supravaginale Am- putation. Rechts vom Uterus das Orangegr. gewachs. zystisch erweiterte Ova- rium. Beim Versuch, den Höhlenwandig. Tumor aus- zuheben, Adhaesionen zu lö- sen, reißt er ein und es ergießt sich ziemlich viel Eiter ins kl. Beck. Abtragung der Adnexe mühs., da auch die linken krankhaft veränd. sind. Im Uterus zeigen sich verschiedene kleine Ab- cesse, weshalb die su- pravaginale Amputation vorgenommen wird. Toi- lette der Bauchhöhle. Tampon. nach Mikulicz.	Post. op. Collaps. — In den ersten Tagen ab- bis 38,4. Gazetamp. im- mer blutig serös durch- tränkt. Gelatine. 17. XI. Entfernung des Beutels. Stets starke Schmerzen im Unterleib. Der Wund- trichter schliesst sich n. langsam.	Um den Stumpf herum fühlt man die verwach- sen. Darmschling. Wohl- befinden.	23. XII. 04
26. I. 05. Laparotomie. Bei der Eröffnung der Bauchhöhle fließt ziem- lich viel klare, gelbliche Flüssigkeit ab. Das Pe- ritoneum ist in seiner maximalen Ausdehnung von einer Unmenge miliarer Knötchen bedeckt. Die Organe im kleinen Becken sind mit den Därmen u. dieser unter sich fest ver- wachsen, so dass von ei- ner Entfernung der er- krankten Teile abgeseh. werden muss. — Schluss auf die Bauchhöhle.	Pat. hat in den ersten Tagen starke Schmerzen, die aber allmählig nach- lassen. Am Tag nach d. Op. und nachher noch einmal 38,5.	Laparotomiewunde p. p. — geheilt. Pat. hat keine Schmerzen, nur n. leichtes Unbehagen. Nir- gends Druckempfindlich- keit. Kein Ascites mehr.	11 III. 05

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
47	Z.-K. 37 Jahr Fabrikarbeit. Basel Solothurn	1905 137	4	Letzte Periode sehr stark und schmerzhaft. Pat. leidet seit 7 Jahren an Fluor. Seit 3 Monaten viel Schmerzen auf der linken Seite. Stuhlgang in den letzten Tagen stets schmerzhaft.	Uterus dextroponiert, -flectiert, gross. Auf der l. Seite ein wallnussgr. druckempfindlicher Tumor. Im hintern Scheidengewölbe links ein Exsudat fühlbar. R. Adnexe etwas vergrössert und verdickt. Diagnose: Pyovar. sinist. Tumor tuboovari- lis dextr. Pelveoperitonitis chron.
48	Sch.-U. 45 J. Hausfrau Basel Basel	1905 216	6	Seit einigen Monaten Schmerzen beim Urinieren. Seit einem Jahr Perioden unregelmässig, zu früh eintretend, 3—4 Tage dauernd, mit Kreuzschmerzen verbunden stärker als früher.	Portio dicht hinter der Symphyse; hinter derselben die Kuppe eines prallelast. Tumors fühlbar, dessen ob. Kuppe von aussen handbr. über der Symphyse fühlbar ist. Adnexe nicht abtastbar. Diagnose: Pyosalpinx duplex.
49	K.-D. 24 Jahr Kellnerin Basel Baselland	1905 294	2	Vor 6 Woch. Schmerzen im Kreuz und Unterleib rechts. Kein Ausfluss. — Brennen beim Wasserlösen.	Uterus anteflectiert, sinistroponiert. — Linke Adnexe dicht neben dem Uterus, wahrscheinl. fixiert. R. ein gut orange-grosser Tumor, ziemlich glatt, frei beweglich. Die Tube schlägt sich auf diesen Tumor über. Diagnose: Pyovarium dextrum.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
28. II. 05. Salpingoophorectomia n. — Salpingectomia extra. Links in dicke Schwar- zen eingebettet, das gän- seigrosse Ovarium. Die Luslösung bereitet gros- e Schwierigkeiten. Die TUBE reisst durch und entl. Eiter. Abtragung d. Adnexa links. Die eben- falls verdickte rechte Tu- be wird entfernt, das Ovarium belassen. Toi- lette d. Bauchhöhle. Ein- führung einer kl. Mèche. Schluss der Bauchhöhle. Das linke Ovarium ent- hält dünnflüss. an Sta- phylococcen reichen Ei- ter.	Morgens 38,0. 4. III. Entfernung der Mèche. 10. III. Entfernung der Nähte. Wunde klappt n. ein wenig. — Weiterer Verlauf normal.	Ut. anteflectiert, nor- mal gross, nicht em- pfindlich. Nirgends ein Exsudat, oder besondere Empfindlichkeit nachzu- weisen.	27. III. 05
29. IV. 05. Amputatio uteri su- pra vaginalis. Salpingo- ophorectomia duplex. Beide Tuben sind in stumpfe Eitersäcke um- gewandelt. Der linksseit. Tumor ist vollständig frei, nirgds. verwachsen; die rechte durch eine breite Adhaesion im Dou- glas verwachsen. Abtra- gen des Uterus am Cer- vix mit den Adnexen. Toilette der Bauchhöhle. Schluss der Bauchwunde.	Einmal Brechen. Am 9. V. Wunde p. p. ge- heilt. Verlauf glatt.	Uterusstumpf anteflec- tiert; frei beweglich; nirgends ein Exsudat. Nir- gends druckempfindlich.	3. VI. 05
29. VI. 05. Salpingoophorectomia extra. R. Ovarium in gänse- grossen fluctuierenden Tumor verwandelt, wel- cher samt d. Tube ent- fernt wird. Schluss der Bauchhöhle.	Am Abend u. am fol- genden Tag 38°. 3mal Brechen. Weiterer Ver- lauf glatt.	Wunde p. p. geheilt. Uterus recliniert, ante- flectiert, klein, beweg- lich. L. Tube und Ovar. O. B. Spärlicher Aus- fluss.	5. VIII. 05

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
50	S.-Z. 32 Jahr Hausfrau Basel Elsass	1905 404	o seit 7 Jahren steril ver- heir.	Vor 11 Woch. Schmer- zen zu beiden Seiten im Abdomen, links mehr wie rechts. Wurde län- gere Zeit hindurch mit Ichthyoltampons behandelt. Periode schmerzhaft.	Uterus klein, nach r. verdrängt, ziemlich frei beweglich. Tuben bds. verdickt; links ein oran- gegrosser fluctuierender Tumor. Diagnose: Pyosalpinx duplex. Pyovarium sin.
51	J.-Th. 30 Jahr Hausfrau Basel Basel	1905 355	I	Im Anschluss an das Wochenbett traten ab u. zu Krämpfe im Abdomen auf, die nach 2—3tägi- ger Dauer jeweilen nach- liessen. Vor 3 Monaten wurden diese Krämpfe stärker und anhaltender. Daneben Auftreten von Fluor. Menses wurden unregelm. und schmerz- haft. Jetzt anhaltende Schmerzen bds. im Un- terleib.	Uterus gross, weich u. stark anteflectiert. In d. Nähe des Fundus ein et- wa nussgrosser Tumor. Links vom Uterus ein klein-apfelgrosser, dicht an der Kante liegender runder, glatter, empfind- licher Tumor. Diagnose: Tumor tu- boov. duplex.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
9. IX. 05. Salpingoophorectomia hist. — Salpingectomy extra p. laparotomiam. Auf der linken Seite ad Ovarium und Tube grosse Eitersäcke ver- wandelt, welche durch ste Adhaerenzen mit d. Umgebung, (namentlich Netz), verwachsen sind. Bei der Lösung der Ad- haerenzen reißt die dün- ne Wand des Tumors an und es ergiesst sich eitriger, übelrie- chender Eiter in Masse in's kleine Becken. Ab- tragung der Adnexe l. rechts ist die Tube eben- falls in einen Eitersack umgewandelt. Das Ov. ist ges. Abtrag. d. Sactosal- pinx, Toil. d. Bauchh. Tam- ponade nach Mikulicz.	Am 2. Tag abends, 38,10; sonst nie Fieber. 12. IX. Entfernung der Tampons. Wenig Sekret. 14. IX. Entfernung des Beutels. Wundtrich. sieht gut aus und verkleinert sich zusehends. Wohl- befinden.	Uterus anteflect., frei beweglich. Nirgends ein Exsudat fühlb. An Stel- le des Wundtricht. klei- ne granulierende Fläche.	9. X. 05
14. VIII. 05. Salpingoophorectomia apl. per laparot. Man fühlt den vergrös- serten Uterus; links da- von einen stark hühner- grossen, verwachsenen Tumor. Ein zweiter Tu- mor findet sich rechts am Fundus uteri. omentum majus mit d. Fundus uteri und dem weiten Tumor verwach- sen. Beim stumpfen Lö- sen der Adhaerenzen platzt eine an der Hin- terfläche des Tumors ge- legene Abscesshöhle. Es ergiesst sich grünlicher, eikulent riechender Ei- ter in die Bauchhöhle. Entfernung des linksseit. Tumors. Beim Lösen des rechtsseit. Tumors platzt er in auf dessen Vorder- seite gelegener Abscess und ergiesst seinen In- halt gegen das kleine Be- cken. Abtragen des Tu- mors. — Tamponade n. Mikulicz.	Viel Kopfschmerzen u. Abendtemperaturen bis 38,40. 18. VIII. Entf. d. Tampons. 19. VIII, 39,2. 21. VIII. Entf. des Beu- tels. Pyocyaneus. Am 2. IX. kein Fieber mehr. Stete Besserung.	Portio liegt nach hin- ten. Uterus recliniert in Anteflexion. Nirgds. ein Exsudat.	23. IX. 05

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
52	Z.-K. 32 Jahr Hausfrau Baden Baden	1905 445	I	Vor 9 Tagen traten plötzl. Krämpfe im Unterleib bes. auf der linken Seite auf. Zugleich verlor Pat. Blut. — Die Schmerzen dauern bis heute an, die Blutung hörte nach Darreichung von Ergotin auf.	Portio weit nach rechts bis an die Beckenwand verschoben durch einen Tumor von prallelast. Konsistenz, der durch eine kleine Furche vom Uterus abzutrennen ist. Diagn.: Tumor ovar.
53	D.-S. 52 J. Modistin Basel Basel	1905 452	○	Anfangs d. Jahres Typhus mit sehr langer Rekonvaleszenz. Klagte immer über einen gespannten Leib. Bekam auch wieder einmal Fieber und der Arzt konstatierte einen Tumor in abdomine. Patientin blieb dann bis heute 4. X. ohne ärztl. Behandlung. Da die Spannung im Leib und die Schmerzen zunahmen, liess Pat. den Arzt kommen, der den sofortig. Spitaltransport anordnete.	Acuss. ein Tumor zu palpieren, der einem im 5. Monat grav. Uterus entspricht. Deutl. fluct., glatte Oberfläche, Unbeweglichkeit. — Virgo intacta. Uterus klein retrovertiert. Der Tumor reicht tief in's Becken hinab und zeigt überall deutl. Fluctuation. Diagn.: Kystoma ovar.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Aus tritt
2. X. 05. Salpingoophorectomia sinistra. Auf der linken Seite ein kindskopfigr. Pyovarium und eine Pyosalpinx. Das abdominale Ende der Pyosalpinx ist mit d. Pyovarium leicht verklebt und löst sich bei den Manipulationen. Dabei ergiesst sich nach Coli riechender Eiter in die Bauchhöhle. Abtragung d. Tumoren. Tamponade nach Mikulicz.	Abends 38,1⁰, sonst nie Fieber. 4. X. Entfernung der Tamp. 7. X. Entf. des Beuteis. Granulationstricht. schliesst sich gut. Wohlbefinden.	Narbe linear geheilt; nur noch kleine granulierende Stelle. Portio hochstehend. Nirgds. ein Exsudat.	17. XI. 05
7. X. 05. Ovariectomy sin. Resection der l. Tube. Man kommt unmittelbar auf den gespannten Tumor. Derselbe ist an vielen Stellen mit der vorderen Bauchwand verwachsen. Der Tumor wird punktiert und es entleert sich massenhaft nach Coli riechender, mit Gewebefetzen und Haaren durchsetzter Eiter. Bei Druck auf die Geschwulst reisst die dünne morsche Wand ein und viel Eiter ergiesst sich in die Bauchhöhle. An 3 Stellen finden sich durch Adhaerenzen hindurch freie Communicationen mit dem Colon, welche vernäht werden. Ablösung der Tumorbildung eines Stieles, in dem sich auch die Tube befindet. Toilette d. Bauchhöhle. Eingiessen von 5% Collarrollösg. Tamponade nach Mikulicz.	Abends 38,6⁰. Puls 160 und mehr. Antistreptococcenserum mehrmals. 8. X. Atmung dyspnoisch. Leib gespannt. Physostigmin.; Winde. 10. X. Rel. Wohlbefinden. Temperatur 37⁰. 11. X. Tampons entfernt, riecht nach Coli. 13. X. Beutelentfernung. Von da an Verlauf normal. Krankenhauser verlängert durch Thromb. d. l. Femoralis.	Portio sehr hoch. Kein Exsudat fühlbar. Im unteren Winkel noch ein frankensteinstückgrosse granulierende Stelle.	17. XI. 05

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
54	W.-G. 34 Jahr Hausfrau Basel Baselland	1905 456	○	Vor 3 Mon. krampf- artige Schmerzen im Leib u. Kreuzschmerzen. Die letzten 3 Perioden wa- ren sehr schmerzhaft, die letzte nur 3 Tage dau- ernd. Seit einigen Wo- chen mässigstark. Fluor. Hie und da Erbrechen.	Uterus in Mittelstel- lung dextropon., durch einen links gelegenen Tumor. Der Tumor geht anscheinend vom linken Ovarium aus, ist beweg- lich, höckerig, fluctuiert teilweise u. ist ca. oran- gegross. Adnexe r. nicht fühlbar. Diagnose: Tumor tu- boovar. sin.
55	Sch.-T. 33 J. Hausfrau Aargau, Aargau	1905 546	○	Seit 2 Jahren immer starke Schmerzen wäh- rend und bis 5 Tage nach den Menses, die stets zunehmen. Seit der gleichen Zeit an Stärke zunehmender Fluor und Druckempfindlichkeit r. im Abdomen.	Uterus klein, anteflec- tiert. Rechts davon ein kindskopfgrosser, flach- höcker., links ein faust- grosser Tumor. Diesel- ben sind prallelastisch, berühren sich im Dou- glas und sind durch eine fühlbare Rinne dort von einander getrennt. Diagnose: Pyosalpinx duplex.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
13. X. 05. Salpingoophorectomia upl. per laparot. Netz mit dem Periton. er vordern Bauchwand verwachsen. Links un- ten ein faustgrosser, ne- ben dem Uterus liegen- der Adnextumor, der mit der Umgebung vollstän- dig verwachsen ist. Bei der Lösung werden eini- ge, zwischen schwarti- gem Gewebe liegende Abscesse eröffnet. Sie enthalten käsigen, einge- kockten Eiter. — Abtra- gung des Tumors. R. zeigt sich das Ovarium als einen hühnereigross. Tumor umgewandelt. Bei Versuch, das Ovarium zu resecieren, zeigt es sich von zahlreichen klei- nen Abscessen durch- setzt, weshalb es ganz entfernt wird. Tampon. nach Mikulicz.	Abends 38,0, Puls 108 leicht unterdrückb. Pat. sehr aufgereggt, klagt üb. starke Schmerzen i. Leib. Stuhl und Winde auf Mi- kroclysmen. 16. X. Leib gespannt. Leberdpfg. n. oben verschoben. Kein Fieber. Puls 128. 17. X. Puls kaum fühlbar. Cam- pher, Coffein. Brechen. Atmung costal. Extremi- täten kühl. Entfernung des Tampons; derselbe ist stark durchfeuchtet, riecht nach Coli. — Col- largol, Antistreptococ- censerum. — Exitus.	Sektion verweig. Path. anat. Diagn. des Tum.: Tuberkulose des Ovar.	17. X. 05
19. XII. 05. Salpingoophorectomia upl. per laparot. In den Tiefen, nament- lich im Douglas, sind zwei Tumoren etwas ad- härent. Beim stumpfen Ösen dieser Adhären- zen platzt der r. Tumor plötzlich und ergiesst viel nach Coli riechen- den Eiter in die Bauch- höhle. Abtragung des rechtsseit. Tumors. Der linksseitige Tumor kann nicht aus den Adhären- zen gelöst und in toto abgetragen werden. Tampon. nach Mikulicz.	Kein Fieber. 23. XII. Entfernung des Tampons samt Beutel. Verl. voll- kommen glatt.	Portio hoch oben. Nir- gends ein Exsudat. L. im Douglas noch leichte Resistenz fühlbar. Kein fluor.	20. I. 06

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
56	St.-J. 23 Jahr Hausfrau Basel Basel	1905 552	○	Vor 4 Monaten Men- ses plötzlich 14 Tage zu- früh eingetreten. Pat. blutet 5 Woch lang con- tinuierlich, hat seither Fluor, der anfangs sehr stark war, jetzt nur noch spärlich ist. Seit- her auch Kreuzschmer- zen bei jeder Periode.	Uterus klein, anteflec- tiert. L. Ovarium wall- nussgross, ziemlich hart beweglich. R. dicht na- ben der Uteruskante ein apfelgrosser, fluctuieren- der Tumor tuboovaria- lis, der das Vaginalgel- wölbe herabdrängt. L. Tube verdickt, haupt- sächlich am uterinen En- de. Im Urethraalsekre- keine Gonococcen. Diagnose: Salpingo- oophoritis sin. Tumo- tuboov. dext. (Pyovar.
57	L.-F. 47 Jahr Hausfrau Basel Solothurn	1906 46	○	Vor 14 Tagen Schmer- zen u. Gefühl von Span- nung im Leib. Fieber. Pat. fühlt, dass sie eine Geschwulst im Leibe habe.	Von aussen fühlt man einen harten Tumor, der in der Grösse einem in 6. Monat graviden Ute- rus entspricht. Auf dem grossen Tumor ist ein kleiner Vorsprung fühl- bar. Per vaginam: Dou- glas durch einen Exsu- dattumor angefüllt, der zungenförmig nach ab- wärts reicht. Der Tu- mor ist druckempfindl. Adnexe nicht durchtast- bar. Diagnose: Myoma ute- ri et Pyosalpinx?

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
18. XII. 05. Punktion und Drainage. Dicht rechts neben der Portio wird der fluctuierende Tumor mit dem Fränkel'schen Dilationsstrokart punktiert, die d. Punktionsöffnung erweitert. Es wird reichlich gelbgrün. Eiter, der nach Coli riecht, abgesehen und sodann die Perhöhle mit Xerof.-Gaze tamponiert.	Vollkomm. glatt. Verlauf.	R. vom Uterus fühlt man noch einen ca. taubeneigross. Rest des Tumors. Die Sonde dringt in der Incisionsöffnung noch ca. 1 cm weit vor.	4. I. 06
12. I. 06. Hysterectomia et salpingectomy dpl. p. lap. Uterus myomatosus. R. eine hühnereigrosse Pyosalpinx, die in starke Verwachsungen eingepfunden. Beim Lösen derselben reisst der Tumor ab und es ergiesst sich viel Eiter in die Bauchhöhle. — Auch rechts die Tube in einen eihnereigr. fluctuierenden Tumor verwandelt, der total entfernt wird. Sodann wird die Entfernung der linksseitigen Adnexe und daran anschliessend die Hysterectomia vorgenommen. Schluss der Bauchhöhle.	Glatter Verlauf.	Kein Stumpfxsud. Noch geringer fluor. Wohlbehalten.	17. II. 06

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
58	M. J. 29 Jahr Tochter Solothurn Solothurn	1906 63	○	Vor 8 Tagen krampf- artige Schmerzen im Un- terleib auf der l. Seite. Zugleich Auftreten von Fluor und Kreuzschmer- zen. Miction schmerz- haft.	Uterus klein, dextro- poniert, bewegl. Links vom Uterus, die ganze linke Seite ausfüllend ein orangebr., posthornför- miger, weicher, etwas beweglicher Tumor. R. Ovarium normal gross, hart. Diagnose: Sactosalpinx purulenta sin.
59	B.-K. 47 Jahr Hausfrau Baden Baden	1906 96	2	Seit 14 Tagen heftige Schmerzen im Kreuz u. im Unterleib links. Seit 8 Tagen zieml. starke Blutung. Vor derselben Fluor.	Corpus uteri vergrös- sert, zu einem glatten, derben Tumor, der un- gefähr einem Uterus der 16. Schwangerschaftswo- che entspricht und die ganze linke Beckenhälfte ausfüllt. Vorne rechts zeigt der Tumor eine Vorwölbung. Adnexe nicht abzutasten. Diagnose: Myoma ut.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
26. I. 06. Salpingoophorectomia plex. Peritoneum mit dem etz verwachs. Becken- gane durch zahlreiche haesiones untereinan- r verwachsen. Links u. chts vom Uterus zeig- n sich tumores tubo- ar., die ohne sie zu rletzen, aus ihren zahl- ichen Adhaesionen ge- st und abgetragen wer- en können. Schluss der auchhöhle. Die bei- en Tumoren enthal- n käsigen Eiter. Path. at. Diagnose : Salpingitis tuberculosa.	Abendtemperatur 38,0. Puls 120. In den folgen- den 2 Tagen Puls dau- ernd frequent u. schlecht. Zunehmend. Spannung d. Leibes ohne Schmerzen. 4. Tag post op. Exit.	Path. anat. Diagnose: Peritonitis univ. acuta.	30. I. 06
10. II. 06. Amputatio uteri supra- ginalis mit Entfernung der Adnexe. Rechts vom myomatö- n uterus ein klein- pfeelgrosser, dicht an d. uteruskante liegender, berall adherent., fluc- tuierender Adnextumor, er in toto stumpf aus- gin. Verwachsungen ge- st u. abgetragen wird. Der Tumor zeigt sich if dem Querschnitt als ehr kammerige Abs- sshöhle, die grünlich omogenen Eiter entl.) arauf Amputat. supra- g. mit Entfernung der dnexen.	In den ersten Tagen Fieber bis 40. Viel Hu- sten, Auswurf. Leib im- mer weich. Später stets afebr. Verlauf normal.	Nirgends ein Exsud., Wohlbefinden.	10. III. 06

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
60	B.-G. 38 Jahr Hausfrau Basel Württemberg	1906 118	9	Seit 1 Jahr starken Fluor und Schmerzen im Leib, namentlich rechts, sowie Stechen bei der Miction. Die letzte Periode ging in einen 4-wöchentlich., continuierlichen Blutabgang über. — Oft Brechreiz.	Uterus wenig beweglich, etwas vergrößert, anteflect. Rechts dicht neben dem Uterus ein höckeriger, derber, beweglicher Tumor; links ein kleiner, wurstförmiger, an der Beckenwand adhaerenter Tumor von weicherer Consistenz. Diagnose: Tumor tuboovar. dupl.
61	O.-W. 36 Jahr Hausfrau Basel Frankreich	1906 246	○	Seit 4 Monat. an Stärke zunehmende Schmerz. im Abdomen rechts. — Seit 10 Tagen Bettruhe. Schmerzen treten bei jeder Bewegung auf. Menses seither verstärkt und schmerzhaft. Nie Ausfluss.	Uterus klein, sinistro-anteponiert. Auf der rechten Seite des Uterus ein orangebr. Tumor, ziemlich glatt, fluctuierend. Hinter dem Uterus links ein kleinerer fester Tumor. Vom Rektum aus zahlreiche harte Knötchen fühlbar. Diagnose: Salpingo-oophoritis dupl. (tuberculosa?)
62	C. H. 30 Jahr Haushälterin Bern Baden	1906 278	○	Seit dem 13. Jahr Schmerzen im Unterleib. Pat. ist nie ganz frei von Schmerzen, die zuweilen ziemlich stark werden. Seit 4 Monaten sind die Schmerzen stärker. Seit Beginn des Leidens stark. gelb. Fluor.	Das ganze Becken von einem Tumor eingenommen, der sich hauptsächlich nach rechts und nach hinten ausbreitet. Er ist prallelastisch und hat einige Kuppen, reicht bis handbreit über die Symphyse u. zeigt Fluctuation. Diagnose: Salpingo-oophoritis dupl. (tuberculosa?) chronica.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
20. II. 06. Salpingoophorectomia — Resectio ovarii Salpingoophorectomia dextra. Auf der linken Seite det sich eine Sacto- pinx, die entfernt rd. Rechterseits, in erke Adhaesionen ein- bettet, ebenfalls eine ctosalpinx, bei deren slös. kleine Abscess- hlen, aus denen Eiter esst, eröffnet werden. ch vorne rechts be- det sich ein weiterer sscess im Parametrium. tfernung der rechten nexe. Tampon auf die undfläche.	In den ersten Tagen p. op. leicht febrile Abend-Temp. Klagt be- ständig über Leibscher- zen. 26. II. abends 39,20 wegen Sekretret. Nach- her stets afebril u. Ver- lauf normal.	Leib noch leicht auf- getrieben. Nirgends ein Exsudat. Gelbl. Fluor. Keine Beschwerden.	30. III. 06
8. V. 06. Salpingoophorectomia dextra. Salpingectomy Peritoneum und Darm t Knötchen besetzt. mtl. Organe sind un- einander verklebt. R. findet sich ein Tumor ooovarialis, der beim slösen von der Um- bung platzt und Ei- entleert. Die krank- ft veränderten Adne- werden entfernt.	In den ersten 4 Ta- gen abends etwas Fie- ber. Keine Schmerzen. Verlauf glatt.	Bauchwunde p. p. ge- heilt. R. hinten fühlt man noch ein Exsudat, zum Teil deutliche Knötchen. (Sitzbäder.)	21. V. 06
1. VI. 06. Salpingoophorectomia plex. Bei der Eröffnung der ritoneum wölbt sich stark aufgetriebene chte Tube vor, die an zeln Stellen adhae- it ist. Bei der Lösung r Adhaesionen reißt r Tumor ein; es ent- ren sich grosse Men- n grünbraunen Eiters. otragung der Adnexe, das Ovar. käsig de- neriert ist. Auch links die Tube in eine Pyo- pinx verwandelt, wel- e samt dem cystisch gen. Ovar. entfernt wird.	Am Abend der Oper. 38,10; am folg. Morgen 38,90; sonst nie Fieber. Keine Schmerzen. Pat. bringt täglich ein paar Stunden im Schwitzka- sten zu wegen eines Ex- subates im Douglas. Wohlbefinden.	Uterus anteflect., -ver- tiert, mit der vorderen Bauchwand offenbar ver- wachsen. Uebrige Umge- bung frei. Rechts hin- ten Resistenz als Reste des Exsudates.	16. VIII. 06

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
63	R. H. 25 Jahr Fabrikarb. Basel Basel	1906 339	I	Vor ca. 8 Monaten starke Schmerzen besonders im Abdomen und starker Fluor von kurzer Dauer. Vor 4 Woch. traten d. näml. Schmerzen wieder auf mit starkem gelbl. Ausfluss. Miction O. B.	Uterus retrovertiert, wenig fixiert. Links ein ziemlich glatter, wenig beweglicher Tumor, der durch einen Stil mit dem Uterus in Verbindung steht. Rechts ein etwas grösserer, prallelastisch, glatter, wenig verschieblicher Tumor. Diagnose: Tumor tuboovar. duplex.
64	C.-J. 30 Jahr Zetlerin Basel Tessin	1906 338	III	Seit 3 Wochen Anfälle von kolikartigen Schmerzen i. Unterleib m. Temperatursteigerung. Vor 8 Tagen plötzlich eitriger Abf. Der Ausfluss dauert seither an. Menses in der letzten Zeit unregelmässig, sonst O. B.	Uterus retroflectiert, L. hinten ein verschieblicher, orangegr., fluctuierender Tumor zu fühlen. Diagnose: Pyovarium sinist.
65	R.-Sch. 42 J. Fabrikarbeit. Basel Baselland	1906 351	V	Vor 8 Tagen starke Schmerzen besonders im Unterleib, nachdem die letzten Perioden unregelmässig aufgetreten u. schmerzhaft waren. Fieber. Stark riechender, eitriger Ausfluss.	Uterus vorne, nach l. abgewichen, anteflectiert. Rechts ein orangegr., glatter, fluctuierender Tumor. Diagnose: Tumor tuboovar. dext.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation.	Entlassungsstatus	Austritt
23. VI. 06. Salpingoophorectomia plex per laparot. Die beiden Adnextu- ren sind zieml. stark t der Umgebung ver- achsen. Der rechte liegt echt am Uterus, ist ca. nseeigross, der linke kleiner und besonders der Gegend der Ar- sacroiliaca adhaerent. er linksseitige Tumor rd gelöst ohne Er- fnung desselben. Die erwachsg. des rechts- it. Tumors sind derber nd reichlich. Beim Lö- n derselben platzt die eschwulst und es ent- ert sich nach Coli rie- ender Eiter in die auchhöhle. Abtragung Tumors. Gaze-Tamp.	In den ersten Tagen post op. febrile Temp. Auch einige Male Bre- chen. Nach Entfernung der Tampons werden die Temp. afebril. Wohlbe- finden.	Uterus dextro-anteflec- tiert. Kein Exsudat. Noch immer etwas eitriger Ausfluss.	25. VII. 06
7. VII. 06. Punktion u. Spaltung es Abscesses. Vom lin- en Scheidengewölbe aus ird der sich leicht vor- ölbende Tumor mit d. rängel'. Dilatationstro- art angestochen, wo- auf sich grosse Men- en stink. Eiters entleeren. rain. m. T-Form. Gummir.	Vollkommen glatter Verl. Sekretion nimmt täglich ab. Afebril.		25. VII. 06
3. VII. 06. Ovariectomia dextra. — alpingoophorect. sin. amponade n. Mikulicz. Uterus im Douglas urch zahlreiche Adhae- onen fixiert. Rechts ne gut apfelgrosse mit ünnflüssigem Inhalt ge- üllte Ovarialcyste. Die nksseit. Adnexe sind ntzündlich verändert u. berall adhaerent. Bei er Lösung entleert sich us der stark aufgetrie- enen Tube Eiter. Die nksseit. Adnexe werden xstirpiert, ebenso der Ovarialtumor in toto ntf. Tampon. n. Mikulicz.	Am Tage nach der Op. einmal 38,8°. 9. VII. Ent- fernung des Mik. Zieml. starke Sekretion. Verlauf glatt. Sekretion nimmt tägl. ab.	Portio an normaler Stelle. Uterus antevert., etwas gross. In der Um- gebung der Wunde bis an den Uterus Fundus ein nicht druckempfind- liches Infiltrat.	14. VIII. 06

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
66	P.-B. 49 Jahr Fabrikarbeit. Aargau Zürich	1906 355	○ Seit 22 J. steril verh.	Vor 4 Woch. Wasser- brennen. Hierauf Schmer- zen im Unterleib. Kein Ausfluss. Seit 8 Tagen in ärztl. Behandl. Wird behufs Operation dem Spital zugewiesen. Kein Fieber.	Uterus stark, nach l. vorne verdrängt. R. h. im Douglas ein prall- elast. Tumor zu fühlen. Diagnose: Kystoma ovariorum dextr.
67	Z.-A. 34 Jahr Hausfrau Basel Baden	1906 359	7	Pat. machte vor 4 Mo- naten einen Abortus m. III. durch. Seither unre- gelmässige Perioden, alle 2—3 Wochen 8—14 Tage andauernd. Dazwischen gelbl. Ausfluss. Vor 14 Tagen plötzlich krampf- artige Schmerzen im Un- terleib; seither Blutung, die bis heute andauert. Nie Fieber.	Uterus im Douglas gross, weich. Links ein kleinhöckeriger, mässig harter Tumor, fest im Becken sitzend. R. Ova- rium leicht vergrössert, Tube verdickt. Diagnose: Salpingo- oophoritis dupl.
68	Sch.-N. 44 J. Hausfrau Basel Basel	1906 487	1	Letzte Periode vor 10 Tagen beginnend; bis heute andauernd, sehr schmerzhaft. Schmerzen im ganzen Unterleib, in's linke Bein ausstrahlend. Miction mit Schmerzen verbunden.	Uterus an die r. Be- ckenwand heran ge- drängt; Becken ausge- füllt durch einen harten Tumor. Adnexe nicht ab- tastbar. Diagnose: Myoma in- traligament.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
28. VI. 06. Salpingoophorectomia impl. per laparot. R. neben dem Uterus in mannsfaustgr., ad- härenter, fluctuierender Tumor. Bei der schwie- rigen Lösung der Adhæ- sionen platzt der Tumor und entleert nach Coli- schenden Eiter. Abtra- gung des Tumors. Links findet sich ein wallnuss- grosser, wenig adhären- ter, fluctuierender Tu- mor, der leicht gelöst und abgetragen werden kann. Tamponade nach Mikulicz.	Am Abend der Oper. 38,4°; sonst nie Fieber. 2. VII. Entfernung des Mikulicz'schen Beutels. Wunde schliesst sich gut. Geringe Sekretion.	Bauchwunde bis auf eine erbsgrosse, granu- lierende Stelle p. p. ge- heilt. Uterus anteflect., beweglich. Kein Exsudat.	10. VIII. 06
3. VII. 09. Salpingoophorectomia n. — Salpingectomy ext Der Tumor links ist in zahlreiche Adhæsion. eingebettet, bei deren Lö- sung der Tumor einreiss und Eiter entleert. Ab- tragung der linksseitig. Adnexe. Aus der rechten vergrösserten Tube ent- leert sich ebenfalls Ei- ter. Die Tube wird ent- fernt, das Ovarium be- lassen. — Schluss der Bauchhöhle.	In den 2 ersten Ta- gen bis 38,6°; sonst nie Fieber. Verlauf glatt.	Wunde p. p. geheilt. Nirgends ein Exsudat.	1. VIII. 06
19. IX. 09. Amputatio uteri su- peravaginalis m. Entfer- nung der Adnexe. Der Tumor erweist sich als intraligamentär entwickeltes Myom des Uterus. Auf der linken Seite ist die stark ver- dickte eiterhaltige Tube und Ovarium mit dem Tumor vollständig ver- wachsen. Die rechte Tu- be ist zur Hydrosalpinx verändert. Entfernung d. myomatösen Uterus mit den Adnexen in toto. — Naht der Bauchdecken.	Am 9. Tag post op. leichte Lungenembolie, v. der sich Pat. gut erholt. Verlauf sonst gut.	Portio in der Mitte. Kein Exsudat. Narbe li- near.	3. XI. 06

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
69	K.-G. 47 Jahr Fabrikarbeit. Basel Baden	1907 52	0	Vor 9 Wochen ste- chende Schmerzen im Un- terleib. Die bis dahin re- gelmässige Periode wur- de unregelmässig, alle 2 bis 3 Wochen sehr stark. Seit 14 Tagen konstant heftige Schmerzen auf d. rechten Seite im Unter- leib.	Portio in der Vulva. Uterus retrovertiert. R. u. l. ein cystischer Tu- mor tuboov. zu fühlen. Am Uterus sind 2 nuss- grosse Myomknot. fühl- bar. Diagnose: Tumor tu- boov. sin.
70	B.-B. 48 Jahr Hausfrau Basel Elsass	1907 66	5	Seit 1 ¹ / ₂ Monaten un- bestimmte Schmerzen im Unterleib. Angebl. Blut- abgang mit dem Stuhl- gang.	Uterus anteflectiert. R. ein höckeriger Tumor hart auf der Douglas- kante aufruhend, auf d. hintere Wand des Uter. übergreifend, apfelgross, von ziemlich harter Con- sistenz. Diagnose: Tumor tu- boovar. dext.
71	Z.-H. 30 Jahr Hausfrau Baden Baden	1907 156	3	Seit zirka 2 Monaten Schmerzen im Unterleib, verbunden mit Blutungen aus der Scheide. Seit 3 Tagen auch Abgang von Eiter.	Ueber dem Becken- eingang links ein hand- breit über das Lig. Pou- parti reichender Tumor, der bis an die Mittel- linie herangeht und sich in einen zweiten Tumor der rechten Beckenhälfte fortsetzt. Uterus reclin. Diagnose: Tumor tu- boovarialis.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
14. I. 07. Hysterectomia totalis ginalis mit Entfernung r Adnexe. Der Uterus wird in d. itte gespalten und zu- st die linke Hälfte mit im cystisch degen. Ovar. d der Tube entfernt. R. id die Adnexe stark haerent. Bei der Lös- g reisst die Tube ein d entleert Eiter. Ent- nung der linken Hälft- mit den Adnexen.	Sechs Tage nach der Operation geht Stuhl durch die Vagina ab. ebenso ziemlich viel Ei- ter. Auch Winde? Nach- her normaler Verlauf.	Scheidentrichter oben noch leicht infiltriert. Kein Abgang von Stuhl und Eiter mehr. Wohl- befinden.	13. II. 07
22. I. 09. Salpingoophorectomia per Laparot. Beim Versuch, den dnextumor zu lösen, rbröckelt derselbe und ntleert viel Eiter in die auchhöhle. Um den Tu- mor herum dick. Schwar- n, in denen einzelne bscesshöhlen sind. Der umor wird entfernt. — ie linken Adnexe sind ormal. — Einlegen von ächen. Schluss der auchhöhle.	Am 3. Tag ist der Verband mit schwarz- brauner, übelriechender Flüssigkeit durchtränkt. Pat. klagt über heftige Schmerzen im Abdomen, die gegen Abend zuneh- men. Leib stark ge- spannt. — Exitus.	Path. anat. Diagnose: Peritonitis univers. pu- rulenta. Phlegmone der Bauchde- cken.	25. I. 07
16. III. 07. Punktion u. Drainage. Dicht an das Schei- engewölbe anstossend tht man einen fluctuie- enden Tumor. Eingeh. it dem Fränkel'schen ilatat.-Trokart n. vor- sgegangen. Probepunk- on. Es entleert sich assenhaft stinkender, icker Eiter. — Einlegen nes Balkendrains.	Zweimal starke Blut- ung aus der Punktions- öffnung. die auf Tam- ponade steht. Wenig Ei- ter mehr.	R. im Scheidengewölbe Narbe. Darüber ein apfel- grosser, links ein oran- gegross. Tumor tuboov.	7. IV. 07

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
72	J. K. 24 Jahr Köchin Basel Württemberg	1907 157	1	War schon vor 1 Jahr in Spitalbehandlung wegen Pelveocellulitis und Perioophoritis dextr. Seit 8 Tagen wieder starke, wehenartige Schmerzen im Unterleib u. Kreuzweh. Seit 1 Jahr gelben Ausfluss. Nie Fieber.	Portio auf d. Beckenboden. Uterus retroflect., leicht aufrichtbar. Links und rechts ein gut hühnereigrosser Tumor tuboovariäls. Diagnose: Salpingoophoritis gon. dpl. Tumores tuboovariales.
73	Ch.-A. 39 Jahr Hausfrau Solothurn	1907 233	4	Vor 5 Jahren Geburt. Im Anschluss daran bemerkt Pat. rechts unten im Leib eine Geschwulst entstehen, die ihr Schmerzen verursacht und stets grösser wird. Periode mit Ausnahme der letzten, welche 4 Wochen dauerte, O. B.	Uterus anteflect., ziemlich gross. Rechts davon dicht anschliessend einen orangegrossen cystischen Tumor tuboovariäls, massig beweglich. Diagnose: Rechtsseit. Adnextumor.
74	M. S. 20 Jahr Glätterin Basel Solothurn	1907 264	○	Seit ca. 1 Jahr Schmerzen rechts und seith. im Abdomen, besond. stark während d. Periode. Seit 4 Woch. an der genannten Stelle ein Tumor auf-tretend, der rasch grösser wurde. Die Schmerzen haben sich in den letzten Wochen aufserste gesteigert.	Uterus retroflectiert, klein, derb. Vor demselben ein längl. ova-ler Tumor, der elastisch. Untere Kuppe des Tum. im vordern Scheidengew. Fluctuation nachweisb. Diagnose: Tumor cysticus ovarii d.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
29. VI. 07. Salpingoophorectomia extra. — Salpingectomia 1. Beide Tuben sind ver- eckt und chron. ent- endet. Rechts sind die adhaerenz leicht lös- bar. Links entleert sich das mit dem Ova- rium verklebten Tuben- peritonium beim Lösen der Verklebung Eiter in die Bauchhöhle. Abtragung der Adnexe rechts, der Tube links. Schluss der Bauchwunde.	Die zwei ersten Tage post op. Abends 38,2 u. 38,4°. Verlauf sonst glatt, Wunde p. p.	Uterus mit dem Fun- dus an der vord. Bauch- wand. Nirgends ein Ex- sudat. Wohlbefinden.	30. VII. 07
6. V. 07. Salpingoophorectomia extra. Der rechtsseitige Tu- mor tuboovar. ist mit Darmschlingen und ei- nem Netzzipfel ziemlich stark verwachsen; bei der Lösung reißt d. Tu- mor an einer Stelle ein und entleert graugelben Eiter. Abtragung des Tumors. Schluss der Bauchhöhle.	Während drei Wochen abends immer Fieber. Aus der Wunde sickert Eiter. Glasdrain's und Spülg. Sekretion nimmt ab. Im Douglas ein Ex- sudat fühlbar.	Bauchwunde und -Fi- stel bis auf einen klei- nen Granulationszapfen gut geheilt. Im Douglas noch immer ein starres quer verlaufendes Exsu- dat.	4. VII. 07
24. V. 07. Salpingectomia dextra. Bei der Eröffnung des Peritonium entleert sich sogleich viel Ascites. Pe- riton. und sämtl. Darm- schlingen mit zahlreichen Nestern bedeckt. R. ein kindskopfgrosser Tu- mor mit glatten Wän- den. Die Punktion er- gibt ca. 450 cm ³ . Eiter. Das abdominale Ende d. Tube ist an Darmschlin- gen adhaerent. Bei der Lösung entleert sich aus dem viel Eiter. Entfer- nung des Tumors. Ein- legen einer Mèche. Schl. der Bauchhöhle.	Am Abend und folgen- den Morgen 38,2°. Sonst keine Fieber. Einmal Bre- chen. Geringe Sekretion. Die Fistel schliesst sich nur langsam.	Bauchwunde gut ge- heilt, noch 2 kleine Fi- stelchen, die wenig se- cernieren. Uterus leicht reclinirt, anteflectirt. Nirgends ein Exsudat.	29. VI. 07

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Parus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
75	A. K. 24 Jahr Köchin Baden Basel	1907 316	○	Von der mediz. Klinik eingeliefert wegen eines Tumors im kleinen Becken. Periode in der letzten Zeit stark und sehr schmerzhaft.	Uterus anteflectiert; r. ein beweglicher, orange-gross., dem Uterus dicht anliegender Tumor. Linkes Ovar. hart; von Exsudaten umgeben. Diagnose: Salpingo-oophoritis tbc. dpl.
76	F.-H. 28 Jahr Hausfrau Basel Basel	1907 351	4	Seit 2 Monaten starken, eitr., übelriechenden Ausfluss. Seit 14 Tagen Schmerzen im Unterleib, besonders rechts. Vor 8 Tagen Eintritt der Periode, die bes. stark und sehr schmerzhaft war.	Uterus anteflect., reclinert. Links und rechts ein Tumor tuboov. von Orangegrösse mit glatter Oberfläche. Diagnose: Tumor tuboov. dupl.
77	H.-G. 49 Jahr Landwirtsch., Baselland Baselland	1907 370	4	Seit ca. einem Monat grosse Müdigkeit. Beim Gehen und Pressen vertiert, fixiert. Hinter Schmerzen im Unterleib. dem Ut. und etwas links Abends immer Fieber bis 39°. Letzte Periode vor 21/2 Mon. Kein Fluor.	Portio unterhalb der Spinallinie. Ut. dextro-vertiert, fixiert. Hinter dem Ut. und etwas links ein ca. kindskopfgrosser, empfindl., gut circumscripter, wenig verschiebbarer Tumor. Kuppe vom Douglas aus kaum zu erreichen. Diagnose: Ovarialcyste (vereitert?)

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
9. VII. 07. Salpingoophorectomia plex. Netz tuberculös er- krankt Gegen die Ad- nexe hin besonders star- ke Verwachsungen und Verklebungen. Beim Los- lösen des rechten Tu- mors reisst dieser ein u. giesst Eiter. Die Ge- ewebe sind alle sehr weich. Abtragung der Adnexe beidseits. Einle- gen eines Glasdrains. — Mort.	Abends 38,2. 4 mal Brechen. 6 Stühle am 2. Tag ohne Nachhilfe. Am dritten Tag morgens einmal Stuhl unter grosser Be- schwerde. Bald darauf Collaps, aus dem sich Pat. nicht mehr erholt. Abends Exitus.	Path. anat. Diagnose: Peritonitis nach Perfor. eines alten tbc. Ulcus. Peritonitis tbc. Verkäste Mediastinaldrüsen. Ca- ries des V. L. W. Ca- ries des r. Ileo sacral gel. Abscesse im Ver- lauf der Austrittst. d. gr. Nervenstämmen d. un- tern Extrem.	12. VII. 07
11. VII. 07. Salpingoophorectomia plex. Links und rechts sind die Adnexe stark ver- wachsen und bilden Tu- moren tuboov. Die Ad- nexe sind ziemlich nicht lösbar. An einer Stelle entsteht eine klei- ne Oeffnung aus der Ei- ter quillt. Gazetampona- de. Glasdrain. Schluss d. Bauchhöhle.	2 mal über 38,0. Ein- mal Brechen. Sekretion sehr gering. Verlauf gl.	Uterus anteflect. Nir- gends ein Exsudat. Nar- be fest. Wohlbefinden.	20. VIII. 07
20. VII. 07. Ovariectomie. Darmschl. mit Bauch- wand und Tumor durch nicht lösliche Adhaeren- zen verbunden. In der Tiefe sind stärkere Ver- wachsungen, bei deren Lösung d. Tumor platzt und viel stinkenden Eiter in die Bauchhöhle giesst. Spülung mit Borwasser. Abtragung des Tumors. Tamponade des kleinen Beckens mit Xeroformgaze. Mort. —	Abends 39,3. — Nach 24 Stunden Exitus.	Sektion verweigert.	21. VII. 07

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
78	D.-B. 40 Jahr Hausfrau Elsass Elsass	1907 384	○	Vor 2 Jahren von Zeit zu Zeit Stechen im Unterleib, das aber bald nachliess. — Vor drei Wochen traten dieselben Schmerzen wieder auf, jedoch in so verstärkter Masse, dass Pat. den Spital aufsucht. Stets wenig dünnen Ausfluss.	Uterus anteflect., nach rechts verschoben. Linke anschliessend ein kindskopfgrosser, derber Tumor, der verschieblich ist. Diagnose: Tumor tubov. sin.
79	M.-S. 42 Jahr Hausfrau Basel Basel	1907 481	9	Seit der letzten Geburt vor elf Monaten Schmerzen rechts im Unterleib. Nachts im Bett stärker. Ausfluss gering.	Handbreit über dem Schambeinast die Kuppe eines Tumors zu fühlen. der druckempfindl. ist. Oberfläche glatt. Per vag. liegt der Tumor dem Uterus eng an. Diagnose: Salpingo-oophoritis dextr.
80	B.-R. 27 Jahr Tochter Baden Bayern	1908 3	○	Vor 9 Monaten dumpfe bohrende Schmerzen im Unterleib, verbunden mit Abgang von schleimig eitrigen Massen im Stuhlgang. Die Schmerzen verschwanden bald. Vor 5 Wochen dieselbe Erkrankung. Menstr. O. B. Kein Fluor.	Uterus vollständig sistroponiert. Rechts ein Tumor von kindskopfgross, die Symphyse überragend das Rectum und das hintere Scheidengewölbe herabdrückend. Pyovarium. Nach dem Uterus zieht die verdickte Salpinx. Linke Adnexe nur undeutlich zu fühlen. Auf Druck entleert sich aus dem Rectum Eiter. Diagnose: Pyovarium mit Durchbruch in's Rectum.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
25. VII. 07. Salpingoophorectomia t. Der Tumor sitzt der ckenwand fest auf u. allseitig fest mit den umgebenden Orga- n verwachsen. Beim ösen der Adhaerenzen esst aus einer hinter r Tube geleg. Höhle ter. Der Tumor wird toto entfernt (enth. ter.) Das kl. Becken rd mit Gaze tampon. d die Bauchhöhle ge- hlossen.	2 mal 38,2. — In der ersten Nacht 2 mal Bre- chen. Beim Verbandwech- sel entleert sich aus d. Drainrohr blutig serös. Sekret. Sekretion nimmt langsam ab. —	Uterus anteflectiert. R. Adnexe O. B. Kein Ex- sudat. Am untern Wund- winkel noch leicht se- cernierende kleine Oeff- nung.	28. VIII. 07
3. X. 09. Salpingoophorectomia extra. Der Tumor ist vom varium gebildet. Da- ber hinweg läuft der oc. vermif. in zahlreichen haesionen gebettet, b. ren Lösung sich Ei- r entleert. Abtragung s Processus vermiform. m Coecum. Die Iso- perung des Tumors muss i Uterusgewebe vorge- ommen werden. Abtrag. s ganzen Paketes. - amponade mit Gaze. - aht. —	Die ersten 2 Tage post. op. abds. bis 38,5°, wenig Brechen. Beim Mè- chenwechsel fließt je- weils ziemlich viel eitrig- seröse Flüssigkeit ab. 14 Tage post op. hat sich in der Laparotomiewun- de ein hühnereigrosser Abscess gebildet, der er- öffnet wird. Langsame Heilung per sec. int.	Uterus anteflect., be- weglich. Nirgends ein Exsudat.	24. XII. 07
weizeitige Incision. I. Annähen des Peri- toneum an die Bauch- wunde. II. Eröffnung des Py- ovarium und Drainage.	Gaze meist stark fä- kulent riechend. Abends immer Fieber bis 39,2°. Beständig Brechen. Se- kretion nimmt langsam ab.		10. I. 08

Lauf. No.	Name, Alter, Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
81	B.-M. 30 Jahr Hausfrau Basel Baden	1908 11	2	Seit ca. 8 Mon. Aus- fluss. Pat. machte Spü- lungen. Vor 8 Tagen plötzl. Schmerzen links im Leib, heftig zuckend. brennende Schmerzen beim Wasserlösen.	Uterus dextro-, ante- vertiert durch einen linksseitigen Tumor von Orangegrösse und Oka- rinoform, von prallelast. Consistenz und glatter Oberfläche. Rechte Tube leicht verdickt, Ovarium etwas vergrössert. Diagnose: Tumor tu- boovar. sin.
82	S.-U. 39 Jahr Ladnerin Basel Basel	1908 16	0	Seit 3 Mon. Schmer- zen im Unterleib angeb- lich infolge Ueberan- strengung an der Näh- maschine. Im Anschluss an die letzte Periode krampfartige Schmerzen. Einmal Brechen. Temp. nie über 37,3 ⁰ .	Uterus antepon. Im Douglas ein rundlicher stark druckempfindlicher Tumor zu fühlen, der sich v. links nach rechts zieht. Tumor sehr re- sistent, lässt sich hin und her verschieben. Diagnose: Tumor tu- boov. dext.
83	K.-V. 36 Jahr Händlerin Basel Basel	1908 87	1	Seit ca. 1/2 Jahr be- stehen Schmerzen im Un- terleib, zeitweise mit Fieber, Fluor, vor den Menses besonders stark. Auch Schmerzen beim Wasserlösen.	Uterus anteflect. Dicht am Uterus anliegend ein kindskopfgross. Tumor. Der Douglas ist durch harte Massen erfüllt. L. Adnexe nicht fühlbar. Diagnose: Salpingo- oophoritis dextra. Pel- veoperitonitis, Pelveocel- lulitis.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
17. XII. 07. Salpingoophorectomia sin. Rechtes Ovarium und be nicht verdickt, mit Umgebung verback. Es wird der durch be und Ovarium ge- dete Tumor abgetra- t. Er enthält Eiter, aus m Staphylococcen ge- chtet werden.	Vollkommen glatter Verlauf. Wunde p. p.	Uterus anteflect., re- clinert. R. Adnexe nicht druckempfindl. R. Lig. sacro-uterin. verdickt u. druckempfindlich.	10. I. 08
6. II. 08. Salpingoophorectomia extra. — Salpingectomy i. Exstirpatio uteri to- vaginal. Spaltung des Uterus in r Mitte. Es ergiesst h bei dieser Manipu- tion bald Eiter aus der operationswunde, von l. r (Pyovarium). Abtra- ng des Uterus, sowie r bds. erkrankten Tu- n. Beide enthalten Ei- r. Entfernung des Pyo- r. sinistr. Tamponade r Bauchhöhle und der heide.	Nie Fieber. Ziemi. viel Brechen. Sekretion ge- ring, hört bald ganz auf.	Scheidenwunde granu- liert noch. Allgemeinbe- finden ziemlich gut, noch grosse Schwäche.	10. III. 08
17. II. 08. Salpingoophorectomia extra. In der Mitte, hinter r Symphyse, ein cysti- her Tum., durch knor- lharte Schwarten mit r Umgeb. verbacken. ei der Lösung platzt r Tumor und entleert are Flüssigkeit. Dane- n eröffnet sich aber ch ein Eiterherd (Pyo- r.) und entleert dünn- issigen, übelriechenden ter. Die Adnexe wer- n rechts nach u. nach eigemacht. Aus der Tu- entleert sich Eiter. anke Adnexe frei. Ab- agung der rechten Ad- xe. Drainage d. Bauch- höhle mit Mäcken und rains.	4 Tage langs abends Temp.-Steig. bis 38,90. Allgemeinbefinden gut. Geringe Sekretion. Wun- de trocken.	Uterus anteflect. R. h. noch Schwielen fühlbar. Kein frisches Exsudat.	6. III. 08

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
84	T. 21 Jahr ohne Basel Frankreich	1908 134	○	Seit zirka 3 Wochen wurde ein Tumor bemerkt, der rasch wuchs. Fluor albus. Schmerzen im Unterleib und im Kreuz.	Uterus retroflect. Fossa vesico uterina durchflut. Exsudat erfüllt. I. fühlt man die Kuppe eines Tum. dessen Punktion Eiter ergibt. Diagnose: Kystoma ovarii purul.
85	V.-U. 45 Jahr Hausfrau Basel Basel	1908 279	1	Seit der letzten Periode vor 10 Tagen hat Pat. immer blutwasserähnlichen Ausfluss. Seither Schmerzen auf beiden Seiten im Unterleib, ebenso im Kreuz. Fieber.	Uterus stark dextrovertiert in Anteflexion. Auf der linken Seite ein glattwandiger Tumor. R. Adnexe anscheinend gesund. Diagnose: Tumor tuboovarialis.
86	St.-Br. 36 Jahr Hausfrau Elsass Italien	1908 352	○	Seit 1 Jahr immer geringe Schmerzen im Unterleib, zieml. viel Ausfluss. Vor fünf Wochen Fieber und vermehrte Schmerzen.	Uterus links hinten fest fixiert. Die hintere Fläche mit schwierigen Rauigkeiten bedeckt. L. Ovarium an der Articulatio sacro-iliaca anscheinend adhaerent, u. druckempfindlich. Rechte Adnexe liegen dicht am Ut., sind schwer abtastb. Diagnose: Retroflexio fixata. Pyosalpinx sin. — Salpingitis dextra.
87	M.-B. 29 Jahr Hausfrau Basel Baden	1908 452	1	Vor 14 Tagen letzte Menses. Seither starke Schmerzen links im Unterleib u. starker Fluor. Fieber. Wasserbrennen.	Uterus recliniert, anteflectiert. L. vom Uterus ein hühnereigr., weicher, etwas unregelmässiger Tumor, überall gut circumscribt, auf Druck empfindlich. R. ein kleinapfelgrosser Tumor. Diagnose: Tumor tuboov. dupl.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation.	Entlassungsstatus	Austritt
13. III. 08. Ovariectomy sin. mit Entfernung der Tube. Bei der Eröffnung des Peritoneum wird sofort ein handkopfgrosser Tumor sichtbar. Derselbe zeigt zahlreiche Adhaerenzen. Die Lösung der Adhaerenzen gelingt ohne Verletzung des Tumors, welcher in toto abgetragen wird.	Am Tag nach der Op. 38,2°. Sonst Verlauf vollkommen glatt.	Uterus anteflect. Kein Exsudat.	28. III. 08
21. V. 08. Salpingoophorectomia duplex. Beidseits Ovarialtumoren, die mit der Umgebung stark verwachsen sind. Bei der manuellen Lösung der Adhaerenzen reisst die linke Tube ein und entleert dicken, gelben Eiter (der reichlich Streptococcen enthält.) Abtragung der linken Adnexe. — Rechts enthält die Tube ebenfalls Eiter. Ovarium vergrössert. Abtragung der Adnexe. — Schluss d. Bauch-Höhle.	Abends 38,3°. 2mal Erbrechen. Temperaturen bleiben ziemlich lange subfebril. Pulsfrequenz hoch. Sonst Verlauf glatt und ohne Beschwerden.	Uterus stark nach r. verlagert. Kein Exsudat. Wunde p. p.	15. VI 08
26. VI. 08. Salpingectomy duplex. Links Abbinden der Tube am Tubenwinkel; dabei entleert sich etwas Eiter. Abtragen der Tube. Rechte Tube vermisst, keinen Eiter enthaltend. Abtragung. — Schluss der Bauchhöhle.	Tägl. Erbrechen. Am 4. Tag abends 38,4°. Puls 132. Kein Stuhlgang. Abdomen stark aufgetrieben u. schmerzhaft. Am 5. Tag Exitus.	Sektion verweigert.	30. VI. 08
1. X. 08. Salpingoophorectomia duplex. Es zeigen sich zahlreiche Adhaesionen mit den Därmen. Nachdem diese gelöst, werden die beiden Tuben in toto entfernt. Sie enthalten Eiter. Schluss d. Bauchh.	Am 1. und 2. Tag abends 38,5°. Wunde trocken, p. p. heilend. Wohlbefinden.	Uterus klein, anteflectiert. Gegend des rechten Adnexstumpfes noch etwas druckempfindlich.	15. X. 08

Lauf. No.	Name, Alter Beruf, Wohn- ort, Heimat	J. No.	Partus	Anamnese	Aufnahmestatus Diagnose
88	B.-Sch. 24 J. Hausfrau Basel Bayern	1908 447	1	Vor 8 Tagen plötzlich stechende Schmerzen im Unterleib auf beiden Sei- ten, die stets zunehmen. Dicker eitrigter Ausfluss. Fieber.	Uterus dextropon., in Anteflexion. R. Ovar. klein, frei bewegl. Tube verdickt, empfindlich. L. ein hühnereigr., glatter, leicht beweglicher, wal- zenförmiger Tumor, der stark druckempfindlich ist. Diagnose: Pyosalpinx duplex.
89	S.-L. 48 Jahr Hausfrau Basel Basel	1908 534	3	Seit 14 Tagen viel eit- riger Ausfluss, mit Fe- tzen und blutigen Be- standteilen. Leib stark aufgetrieben. Vor 4 Ta- gen wesentl. Verschlim- merung. Brechen, viel Aufstossen. Heft. Schmer- zen im Unterleib.	Uterus links hinten. Rechts davon ein Tumor von harter Consistenz. Es geht zieml. viel Blut ab m. Schleimhautfetzen. Links ebenfalls ein Tu- mor. Diagnose: Peritonitis. Pyosalpinx, Pyovarium.
90	St.-K. 38 Jahr Putzerin Basel Aargau	1908 604	1	Menses seit Partus vor 1 Jahr unregelmässig, in den letzten Monaten alle 14 Tage. Auch in den Intervallen Abgang von wenig Blut. Seit 8 Tagen Schmerzen im Unterleib, die nach den Hüften u. ins linke Bein ausstrah- len.	Uterus antefl., leicht dextroponiert. Links ein höckeriger, ziemlich fe- ster Tumor, der der Ut- terus kante dicht anl., orange- gross und leicht druck- empfindlich ist. Rechte Adnexe nicht deutlich abtabbar, da der Ute- rus dicht an die Becken- wand geschoben ist. Diag.: Tumor tuboov. sin.

Operation Datum	Verlauf nach der Operation	Entlassungsstatus	Austritt
21. VIII. 08. Salpingectomy duplex. Tube beidseits stark aufgetrieben. Ovar. derb. Leichte Verwachsungen mit den Därmen. Lösen der Adhaerenzen. Abtra- gen der Tuben beidseits. Die Tuben enthalten Ei- ter. — Schluss d. Bauch- Höhle.	Nie Fieber. In den er- sten Tagen heft. Schmer- zen im Op.-Gebiet. — Wunde p. p.	Allgemeinbefinden gut. Linkes Ovarium druck- empfindlich. R. Ovarium nicht ganz frei. Nirgends Exsudat.	12. IX. 08
23 .XI. 08. Ovariectomy dextra. — Drainage der Bauch- höhle. Beim Eröffnen des Pe- ritoneum tritt viel Ei- ter aus der Bauchhöhle. Man gelangt in einen abgesackten Raum, in dem ein grosser Tumor tuboovar. fixiert liegt, der nur mit Mühe aus- geschält werden kann. L. ein kleinerer Tumor d. Adnexe. — Abtragen d. rechtsseitigen Tumors. Spülung der Bauchhöhle. Drainage mit Gummi- drain und Mächen.	Exitus 6 St. p. op.	Keine Sektion.	23. XI. 08
12. XI. 08. Salpingo-oophorectomia duplex. Beim Versuch, den Tu- mor hervor zu wälzen, reisst er ein und ent- leert viel Eiter in die Bauchhöhle. Abtrag. des Tum. sowie d. rechts- seitigen krankhaft ver- änderten Adnexe. Tam- pon. d. kleinen Beckens mit Mächen; Einlegen v. Glasdrains. Schluss der Bauchhöhle.	Nie Fieber. Verlauf gl.	Wunde bis auf eine kl. Stelle (Drainageöffnung) geheilt. Uterus anteflec- tiert. Auf der linken S. ein ca. nussgrosser Ex- sudatrest, an der Stelle, an der das Drainrohr lag.	30. XI. 08

Von diesen 90 Fällen eitriger Adnexerkrankungen waren:

Pyosalpinx	7 Fälle
Pyosalpinx und Pyovarium	22 „
Salpingitis, Perisalpingitis mit Ovarialabscessen	11 „
Entzündliche Tumores tuboovariales	38 „
Tuberkulose	5 „
Vereiterte Ovarialcysten	7 „
	90 Fälle

Von diesen 90 Fällen eitriger Adnexentzündungen sind operiert:

Mit Laparotomie ohne Drainage	25 Fälle
Mit Tamponade nach Mikulicz	30 „
Mit Mèchen oder Glasdrains	15 „
Durch vaginale Operation	13 „
Durch vaginale Incision	6 „
Zweizeitige Operation	1 „
	90 Fälle

In der Nachbehandlung trat Fieber auf:

In den 25 ohne Drainage behandelten Fällen 18 mal

Heilungsdauer dieser Fälle $30\frac{1}{2}$ Tage

Todesfälle: 3.

In den 30 mit Mikulicz'scher Tamponade behandelten

Fällen 15 mal

Heilungsdauer dieser Fälle $45\frac{1}{2}$ Tage

Todesfälle: 4.

In den 15 mit Mèchen oder Glasdrains behandelten Fällen 11 mal

Heilungsdauer dieser Fälle $33\frac{1}{2}$ Tage

Todesfälle: 7.

In den 13 mit vaginalen Operation behandelten Fällen 4 mal

Heilungsdauer dieser Fälle $30\frac{1}{2}$ Tage.

Todesfälle: 0.

In den 6 mit vaginalen Incision behandelten Fällen 0 mal

Heilungsdauer dieser Fälle 30 Tage

Todesfälle: 0.

In dem einen durch zweizeitige Operation behandelten

Fall 1 mal

Durchschnittlicher Aufenthalt der Kranken in der Anstalt nach der Operation 34 Tage.

Gestorben sind 14 Fälle = 15,5%.

Bei der der Entlassung unmittelbar vorangehenden Untersuchung wiesen sechs Patientinnen (Fall 8, 11, 21, 32, 56, 71) noch ein Stumpfxsudat mit Schwielen und pelveoperitoneales Exsudat auf.

In 12 Fällen hatte sich ein Stumpfxsudat gebildet (Fall 10, 17, 22, 34, 61, 62, 65, 69, 73, 81, 83, 90).

In den 45 mit Drainage behandelten Fällen (30 mit Tampnade nach Mikulicz, 15 mit Mächen und Glasdrains) wurde drainiert:

Wegen anders nicht stillbarer Blutung	1 mal
Wegen Eiterung	41 mal
Wegen Zurückbleiben von Abscessmembranen	2 mal
Wegen einer durch Naht verschlossenen Darm- schlinge	1 mal

In einem Falle von Tuberkulose wurde die Laparotomie gemacht und wegen der Unmöglichkeit, die erkrankten Partien auch nur teilweise zu entfernen, die Bauchhöhle wieder geschlossen (Fall 46).

Die Resultate dieser 90 operierten Fälle sind insofern als ungünstige zu bezeichnen, dass davon 14 Fälle = 15,5% starben. Doch muss bemerkt werden, dass die Tuberkulosen mit eingerechnet sind, die mancher Operateur gesondert abhandelt und aus seiner allgemeinen Statistik ausscheidet. Und Tuberkulose verschlechtert nach der allgemeinen Erfahrung die Voraussage ganz erheblich. Die Berichte aus anderen Kliniken lauten sehr verschieden; die Zahlen, die mir zur Verfügung stehen, schwanken zwischen 3,5 und 20%. Es hatte

Winter	3,5 %
Fehling	4,0 %
Chroback	4,1 %
Schauta	6,0 %
Hofmeier	7,7 %
v. Herff	15,5 %
Jung	20,0 % Todesfälle

Die 14 Todesfälle der Baslerklinik betreffen alles Patientinnen, bei denen die Laparotomie ausgeführt wurde. Es hatten weder die Incisionen vom hinteren Scheidegewölbe aus, noch die vaginalen Verfahren mit und ohne Entfernung des Uterus Todesfälle zur Folge und verdienen demnach, wenn operiert werden muss, und wenn anwendbar, den Vorzug vor den Laparotomien. Dieser Vorzug ist aber nur ein scheinbarer, da natürlich die schwersten und gefährlichsten Fälle, die Tuberkulosen, der Laparotomie anheimfallen.

Aehnliche Resultate hat auch z. B. Schauta: bei abdominalen Radikaloperationen 10,5 %, bei vaginalen 2,7 % Mortalität.

Von den 25 ohne Drainage behandelten Fällen starben 3 = 12,0 %.

Von den 45 mit Drainage behandelten Fällen starben 11 = 24,4 %.

Fehling hatte 5,8 % Mortalität bei seinen mit Drainage behandelten, 2,8 % bei den nicht drainierten Fällen und führt die höhere Mortalität darauf zurück, dass nur die schwersten Fälle drainiert wurden.

Die hohe Mortalitätsziffer der Baslerfälle lässt aber doch darauf schliessen, dass auch eine noch so peinlich exakte Drainage, die z. B. in gleicher technischer Ausführung in Strassburg vorgenommen wird, nicht vermag, einen günstigen Verlauf zu garantieren. Die Aussicht, dass nach Drainage, besonders Mikulicz'scher, so leicht Hernien entstehen (leider war es mir nicht möglich, die Fälle dieser Arbeit nach dieser Richtung hin zu untersuchen, da sie zu weit in der Schweiz, in Baden und Elsass verbreitet sind), lässt auch die Frage auftauchen, ob überhaupt drainiert werden soll, und ob der Nutzen der Drainage den Schaden einer Hernie aufwiegt? Den besten Schutz gegen Hernienbildung bildet bekanntlich die *prima intentio* einer Wunde, und es wird deshalb stets anzustreben sein, eine Laparotomiewunde vollständig zu verschliessen, damit nicht an Stelle, an der die Drainage die Bauchhöhle verlässt, später eine schwache Stelle entstehe. Dadurch, dass wir in der Spülung der Bauchhöhle bei Laparotomien ein Mittel in der Hand haben, die Bauchhöhle auf mechanischem Wege von infektiösen und infektionsverdächtigen Stoffen zu reinigen, und

dass das Peritoneum selbst gewissen Infektionsstoffen gegenüber eine grosse Widerstandskraft besitzt, wird es möglich werden, die Drainage mehr und mehr ausser Anwendung zu bringen und für diejenigen Fälle zu reservieren, wo es gilt, flächenhafte und parenchymatöse Blutungen, die der Unterbindung und Umstechung trotzen, zu stillen, oder Perforationsöffnungen des Darmes, die anders nicht geschlossen werden können, durch Erzielung abschliessender Pseudomembranen zum Verschluss zu bringen.

Was nun die Heilungsdauer anbelangt, so beträgt sie im Durchschnitt bei den mit Mikulicz'scher Drainage behandelten Fällen 45 Tage, bei den mit Gaze-, Gummi- oder Glasdrains behandelten Fällen $33\frac{1}{2}$ Tage, bei den ohne Drainage behandelten Fällen $30\frac{1}{2}$ Tage. Das heisst: Die Drainage verlängert die Heilungsdauer.

Die Operation wird so lange als möglich herauszuschieben sein, weil dadurch der Eiter seine Gefährlichkeit verliert. Das „ubi pus, ibi evacua“ der Chirurgen hat für den Gynäkologen keine Giltigkeit, da die Erfahrung lehrt, dass Eiter, der im menschlichen Körper eingeschlossen ist, einer regressiven Metamorphose unterliegt und steril wird. Bei Sektionen findet man hie und da in Tuben eingeschlossene, trockene, krümelige, gelbe Massen, die nichts anderes als Eiter sind. Die Besitzerinnen dieser Eitertuben haben dieselben vielleicht jahrelang ohne jedwede Beschwerde mit sich herumgetragen. Ist aber der Eiter einmal auf diese Weise kulturell und mikroskopisch steril geworden, dann bildet er auch keine Gefahr mehr für die Patientin. Kiefer hat in seinen „Virulenzverhältnissen der Adnexeiterungen“ nachgewiesen, dass $\frac{3}{4}$ —1 Jahr nach der Infektion der Eiter steril wird. Wird man wegen der Notwendigkeit, die Arbeitsfähigkeit einer Patientin möglichst bald wieder herzustellen, zur Operation gedrängt, dann würde der Zeitpunkt ein Jahr nach der Infektion der günstigste sein, denn nun ist der Eiter ziemlich steril. Dann ist es auch nicht nötig zu drainieren und die Gefahr der Hernienbildung fällt weg. Es wird aber in den wenigsten Fällen möglich sein, festzustellen, wann eine Patientin infiziert wurde. Und wenn dies möglich ist, wird es nicht gerade zutreffen, dass im Moment, in dem man zur Operation gezwungen wird, eben ein Jahr seit der Infektion verflossen ist. In solchen Fällen wird man zweifelsohne zu den Ope-

rationsmethoden sich entschliessen, welche eine kurze Heilungsdauer haben, und dies sind nach den Erfahrungen der Basler-Klinik die vaginalen Operationen und Incisionen mit Drainage, welche, wie schon oben erwähnt, auch in Bezug auf die Mortalität die günstigsten Resultate ergeben haben.

Herr Prof. Herff entschliesst sich höchst ungern zu diesen Operationen; er verfährt, so lange wie nur möglich, konservativ, auch bei der Tuberkulose. Dieser Umstand, dass nur schwerste, insbesondere tuberkulöse Erkrankungen mit ausgedehnten Eiterungen operativ angegriffen werden, erklärt die hohe Verlustzahl gegenüber manchen Operateuren, die auch leichte Fälle, etwa aus sozialen Gründen, operieren. Der Prozentsatz der Verluste muss dabei kleiner ausfallen.

Die Incisionen oder besser Punktionen wurden, nach vorausgegangener Probepunktion, mit dem Fränkel'schen Dilatationstrokart im hintern Scheidengewölbe vorgenommen und in die Öffnung nunmehr ein T-förmiges Gummirohr oder ein biegsames Metall drain nach Lemaire, eingelegt. Der Eiterabfluss erwies sich in allen Fällen als genügend.

Die Incisionen haben den Nachteil, dass meistens Residuen der Entzündung zurückbleiben, die späterhin unter sehr viel ungünstigeren Verhältnissen erneute Eröffnungen verlangen oder die Entfernung indicieren, wie dies auch bei No. 8, 21, 32, 55 u. 71 der Fall war.

Wenn ich als Heilungsdauer der mit vaginaler Incision behandelten Fälle 30 Tage angegeben habe, dann ist dies insofern nicht ganz richtig, als die 30 Tage den Spitalaufenthalt von Operation bis Entlassung bedeuten. Alle 6 Patientinnen wurden mit mehr oder minder starker Sekretion aus dem Spital entlassen. Immerhin waren sie soweit hergestellt, dass sie ihren Beruf als Hausfrauen wieder aufnehmen konnten.

Ich möchte auch insofern dieser konservativ-operativen Behandlung das Wort sprechen, als eine Bewirkung der anticipierten Climax durch die Entfernung des Uterus mit den Adnexen oder der Adnexe allein nicht gleichgiltig sein kann. Manche Frauen haben lange und schwer unter den Erscheinungen des Climacterium zu leiden, und Chrobak hebt hervor, dass die sogenannten

climacterischen Beschwerden nach der operativen Entfernung der Keimdrüsen schwerer und viel hartnäckiger sind, als es bei dem normalen, physiologischen Climax der Fall ist. Er steht deshalb auf dem Standpunkt, erst dann zu operieren, wenn mehrere der conservativen Heilmethoden fruchtlos versucht worden sind.

Schauta scheint einen verfrühten Climax nicht zu befürchten, denn er verlangt — wenigstens bei gnorrhöischer — Adnexerkrankung gleich beide Adnexe in toto zu entfernen, auch wenn nur die eine Seite makroskopisch erkrankt scheint. —

Herrn Prov. Dr. O. v. Herff- v. Salis, meinem verehrten Lehrer spreche ich für die Anregung zu dieser Arbeit und für die Ueberlassung des Materials meinen besten Dank aus.



